A Lanner falcon is perched on a weathered wooden post. The bird has a white breast with dark spots, a dark cap, and a yellow beak. It is looking towards the right. The background is a soft, out-of-focus landscape with a blue sky and brown ground.

*Kenya
12 - 28. september
2022*

- en rejse med DOF Travel

*Lannerfalk nær Narok
Foto: Ingelise Aarøe Petersen*



At rejsen blev en stor succes skyldes ikke mindst Washington Wachira – vores fine lokale guide. Foto: Søren Skov

Forord

Verdens største koncentration af vilde dyr tilsat et væld af fascinerende fugle. Østafrika er med rette kendt for sin enestående natur, og DOF Travel storturen til Kenya i september 2022 blev da også en helstøbt fugle- og naturrejse med mange oplevelser, der vil blive husket længe efter.

På den 17 dage lange rejse besøgte vi Masai Mara midt i gnuernes store træk – ”the big migration”, Kakamega-regnskoven, der er den østligste udløber af Congo-regnskoven, de fuglerige søer i Rift Valley – Naivasha, Nakuru og Baringo, den støvede og knastørre savanne i Samburu og det frodige højland ved Aberdares og Mount Kenya.

Undervejs så vi i alt 476 fuglearter og 50 pattedyrarter. Trods den relativt korte rejse, hvor vi ikke besøgte det østlige Kenya og dermed heller ikke kysten, fik vi derfor et godt kendskab til mange fascinerende fugle og pattedyr i Kenya.

At rejsen blev en succes skyldes ikke mindst vores lokale samarbejdspartner – Cisticola Tours, der arrangerer fuglerejser over hele Østafrika. På storturen med DOF Travel var Cisticola Tours repræsenteret af chauffør og driverguide, Jack Kiiru, samt chauffør, biolog og indehaver af Cisticola Tours - Washington Wachira.

Washington Wachira, var enestående som lokal samarbejdspartner og guide og fortjener derfor et par ord med på vejen. Han er uddannet biolog fra Kenyatta-universitetet i Nairobi. Allerede som studerende grundlagde Washington Wachira sin guidevirksomhed, og i en alder af 30 år har han nu to safari-firmaer, der er specialiseret i henholdsvis fuglesafarier (Cisticola Tours) og pattedyr-safarier (Bovid Safaris).

De to safarifirmaer råder i dag over 10 specialbyggede Toyota Landcruisere til safarikørsel samt 30 guider i alt i Kenya, Tanzania og Uganda samt Rwanda.

Washington Waschira er formand for Østafrikas Raritetskomite - svarende til det danske SU, der godkender sjældne fugles forekomster i hele Østafrika.

Hans omfattende viden rækker langt udover fuglene, bl.a. har Washington Wachira beskrevet et nyt krybdyr for verden - en agame i det nordlige Kenya. Han samarbejder derudover med National Geographic, og er også stærkt engageret i det lokale naturbeskyttelsesarbejde.

Endelig er Washington Wachira også sponsor for Kenya Women Birders, hvor unge kvinder lærer at se på fugle, så de kan blive uddannet til safariguider med speciale i fugle. Deltagerne i denne storslåede rejse var: Orla Hugger Jakobsen, Birgit og John Hansen, Uffe Fester, Georg Guldvang, Ingelise Aarøe Petersen og Hans Drostgaard, Finn Lund Henriksen, Janne Krogh Lukassen, Troels M. Krogh, Kirsten Lundsby Hansen og Søren Skov, turleder.

Rejsen dag for dag

12. september

Vi mødtes i Kastrup Lufthavn tidlig morgen - eller rettere midt om natten kl. 3.30 i Terminal 2, Derefter fløj vi med Lufthansa fra Kastrup til Frankfurt og herfra videre til Nairobi, hvor vi ankom 20.15. Lufthavnen i Nairobi var præget af et stort menneskemylder, da der dagen efter skulle være officiel indsættelse af Kenyas nyvalgte præsident, men vi blev heldigvis straks budt velkommende af en repræsentant for Cisticola Tours. Efter lidt ventetid lykkedes det også for vores to specialbyggede landcruisere at komme igennem menneskemængden, så vi kunne fortsætte til rejsens første overnatningssted i den vestlige udkant af Nairobi - Wildebeest Camp. Her blev vi installeret i faste luksustelte med eget badeværelse.

13. september

Vi blev vækket af Hadada Ibissens højtlydende kald i det spæde morgengry. Så snart det blev lyst, blev de første fugle set i form af White-browed Sparrow Weaver, der på resten af rejsen blev kaldt fugl nr.1.

Efter morgenmaden kl. 7, kørte vi kl 8 i vores safaribiler med kurs mod Masai Mara.

Undervejs havde vi flere fine stop - bl.a. ved Rift Valley.

De første zebraer blev set allerede før Narok, der i dag er en overraskende stor by. Vi fortsatte mod Masai Mara, hvor vi spiste en sen frokost med medbragte madpakker.

De sene frokoster med kylling, juice og en sandwich blev sammen med morgenmad kl. 7 og afgang i bilerne kl. 8 en fast del af den daglige rutine på hele rejsen.

Så snart vi var kommet ind i Masai Mara, blev vi mødt af storslåede udsigter, grønt græs, og et overflødhedshorn af fugle og pattedyr. Gnuer, topier, zebraer, sekretærfugle, flokke af wattled starlings, gribbe og meget, meget mere.

Vi installerede os på Keekorok Lodge, hvor vi skulle bo i tre dage.




Så snart vi nåede Masai Mara, blev der kigget intensivt efter fugle og dyr. Foto: Søren Skov



Vi så overraskende mange sekretærfugle i Masai Mara. Foto: Søren Skov



Vi oplevede gnuernes "big migration", idet vi så op mod en halv million gnuer i Masai Mara. En stor oplevelse. Foto: Søren Skov



African Wild Cat – forfaderen til vores almindelige tamme huskat. Den er almindelig i store dele af Afrika, men svær at se. Vi var heldige i Masai Mara. Foto: Søren Skov



Saddlebill Storks i Masai Mara – en af Østafrikas mest imponerende fugle. Foto Søren Skov

14. - 15. september

De næste to hele dage udforskede vi Masai Mara. Det var midt i højsæsonen for "The Great Migration". Fra juni til midt i oktober opholder enorme mængder af dyr sig i Masai Mara, der er den nordlige, kenyanske del af Serengeti øko-systemet.

I alt er der omkring halvanden million gnuer, en halv million zebraer og en halv million blandet antiloper, der trækker rundt i Masai Mara og Serengeti efter regnen og dermed



Rosy-throated Longclaw – en specialitet for Masai Mara. Foto: Søren Skov

grønt græs. Dermed er Masai Mara - Serengeti hjemsted for den største koncentration af vilde pattedyr i verden.

Da vi besøgte Masai Mara, opholdt den største koncentration af dyr sig længst mod vest i Masai Mara - i den såkaldte Mara Triangel. Sidst i september og begyndelsen af oktober vil de fleste dyr være nået længere mod øst og dermed til området nær Keekorok, hvorpå de frem mod medio oktober trækker til Serengeti på den anden side af grænsen.

Vi inddelte derfor vores to hele dage i Masai Mara, så vi den 14. september kørte til Mara Triangel og oplevede den enestående koncentration af store dyreflokke. Her så vi op mod en halv million gnuer og 200.000 zebraer, mens vi den 15. september kørte rundt i den nordlige del af Masai Mara, hvor vi bl.a. så gepard, samt i den østlige del af Masai Mara ind mod grænsen til beboede områder. Her var der godt med småfugle.

Derudover var vi begge dage rundt i parken ved Keekorok Lodge tidlig morgen og aften. Her var der både en mindre sø med flodheste samt et hjørne med frodig bevoksning, som var god for en lang række småfugle. Den store plæne mellem det frodige krat og lodgebygningen kunne også byde på fine oplevelser, idet Southern Ground Hornbill sås flere gange netop her.

Græsset i Masai Mara var grønt og frodigt, da det havde regnet pænt i ugerne før vi kom, og regnen viste ikke tegn på ophør. På vores vej tilbage fra Mara Triangel til Keekorok 14. september løb vi da også ind i et gevaldigt regnvejr.

De store dyreflokke havde derfor ikke travlt med at krydse Mara River og forlade Masai Mara. Vi så kun et enkelt lig af en druknet gnu i Mara River. Når det er højsæson for krydsning af Mara River, kan der ligge hundredvis af druknede gnuer i store bunker langs med flodbredderne.



Den endemiske og stærkt truede Sharpe´s Longclaw. Foto: Søren Skov

16. september

Vi kørte langsomt ud af Masai Mara, mens vi sugede de sidste indtryk til os fra dette imponerende naturområde.

Derpå kørte vi til Naivasha og højlandet umiddelbart øst for Naivasha by, idet vi først kørte til et mindre område på Kinanagop Plateau, hvor den naturlige biotop med langt, højt græs var bevaret. En lokal guide stod klar til at tage imod os, så vi både kunne se Montane Nightjar og lede efter den i dag meget sjældne Sharpe´s Longclaw.

Det er værd at bemærke, at biotopen til Sharpe´s Longclaw på Kinanagop Plateau kun er blevet bevaret, ved at Washington Wachira betaler den lokale lodsejer for ikke at dyrke det op. Til gengæld kan han her tage rejsende fugleturister med Cisticola Tours op til græsområdet og fremvise den sjældne fugl. Et godt eksempel på at øko-turisme kan hjælpe truet biodiversitet.

Ved hjælp af vores lokale guide fandt vi Sharpe´s Longclaw ret hurtigt, og kørte derefter til vores hotel vest for byen - Lake Naivasha Resort, hvor vi installerede os for to nætter. Hotellet var stort og flot, men både indtjekningen og serveringen om aftenen var noget kikset. Til gengæld var beliggenheden helt i top, idet den store park stødte ned til søen. Eftermiddagens gåtur i parken med udsigt til søen gav derfor mange gode fugleoplevelser.

17. september

Morgenen og formiddagen blev brugt ved Lake Naivasha, idet vi først var på en lille gåtur nær søen og derefter på en mere end tre timer lang sejltur med mindre både.

Sejlturen var et af rejsens ornitologiske højdepunkter med mængder af fugle.

Efter frokost kørte vi til Aberdares Nationalpark, der var rejsens topografiske højdepunkt, idet vi her kom op i 3200 meter over havet. Den frodige højlandsskov i Aberdares



Ved Naivasha-søen så vi den fine Black Heron. Foto: Søren Skov



Hadada Ibis ved Naivasha-søen. Den let genkendelige stemme har givet den tilnavnet "Voice of Africa". Foto: Søren Skov



African Spoonbill ved Naivasha-søen. Foto: Søren Skov



Vandfald og højlandsskov i Aberdares National Park. Foto: Søren Skov



Jackson's Spurfowl i Abedares National Park. Foto Søren Skov



Fuglekig i Kakamega Forest. Foto: Uffe Fester

imponerede, men vi havde desværre ikke tid til ordentlige vandreture i området, så vi måtte nøjes med at køre safrikørsel med åbent tag og på den måde få et indtryk af det rige fugle- og dyreliv i Aberdares. Vi fik bl.a. set Jackson's Spurfowl, den for Kenya endemiske Kikuyu White-eye og den ligeledes endemiske Aberdare Cisticola.

18. september

Vi drog videre mod vest med stop undervejs. Dagens mål var den enestående Kakamega-regnskov i det vestlige Kenya. Her kan man opleve mange skovarter, som man ellers skal rejse til Uganda og Congo for at se. Ved ankomsten til Kakamega-skoven, begyndte vi straks at se på fugle. Belønningen var bl.a. en flot Red-headed Malimbe.

Vi fik derpå installeret os på det fine Ronda Retreat, der ligger midt i skoven. Her skulle vi bo i de næste to nætter. Derpå vandrede vi ned ad en stentrappe til et lille vandløb, hvor de fleste med lidt tålmodighed fik set den smukke, men sky White-spotted Flufftail, som gemte sig i den tætte underskov langs med skovbækken.

Derefter begyndte det at regne. Ulempen ved at besøge en regnskov er jo, at man her kan risikere regn, men heldigvis kom der en pause i regnvejret, hvor vi bl.a. kunne beundre Crowned Eagle ved rede, idet den ynglede midt i parken ved Rondo Retreat.

19. september

Vi fortsatte med at udforske Kakamega-skoven, idet vi morgen og formiddag gik en fin tur ad en skovsti, hvor vi bl.a. oplevede Great Blue Turaco og African Broadbills særegne "sang", hvor den flyver i en cirkel rundt om sig selv, mens halefjerene afgiver en højlydt, brummende lyd. Derefter var det tid til en gåtur ved Forest Station, men fugleaktiviteten var nu aftaget, eftersom vi var langt op ad formiddagen.

Et stort regnvejr midt på dagen greb forstyrrende ind i dagsplanen, da regnen efterlod skovstierne så mudrede, at mange valgte at blive hjemme fra eftermiddagens vandretur,



Black and White Colobus i Kakamega – en af verdens smukkeste aber. Foto: Søren Skov



White-crested Turaco sås fint på vej til Baringo: Foto: Søren Skov

men dem, der mødte op, fik mange fine oplevelser, da der efter regnen var god aktivitet hos fuglene – bl.a sås Blue-headed Bee-eater.

Vi fik også fine møder med Black and White Colobus, samt med Blue Monkey og Red-tailed Monkey.

20. september

Vi forlod Kakamega og med stop undervejs kørte vi mod Baringo i det nordvestlige Kenya. Undervejs skiftede landskabet fuldstændig karakter, idet Kakamega-regnskoven ligger i et frodigt område ind mod grænsen til Uganda, mens Lake Baringo hører til den varme, tørre del af Kenya. Mens vi var ved Baringo, var der forholdsvis køligt med 30-35 grader, men temperaturerne ved Baringo kan snildt nå op på 40-45 grader.

Fine observationer af såvel Ross Turaco som White-crested Turaco gjorde dagens stop under kørslen til en succes, og vores held stoppede ikke her. Ved ankomsten til Baringo spiste vi frokost nær en kløft/forkastning i klipperne vest for søen.

Frem til aften gik vi flere ture i det tørre, men fuglerige landskab og så her en lang række spændende og usædvanlige arter – Three-banded Courser, Slender-tailed Nightjar, Northern White-faced Owl og meget mere.

Derpå tjekkede vi ind på Lake Baringo Soi Lodge, der ligger smukt direkte ned mod søen. Her skulle vi bo i to nætter.



African Fish Eagle ved Baringo. Foto: John Hansen



Resterne af den nu oversvømmede Roberts Camp ved Lake Baringo. Her lå Kirsten og Søren i telt, da de mødtes i sommeren 1983 i Kenya. Foto: John Hansen

21. september

Vi begyndte dagen med en mere end tre timer lang sejltur på Lake Baringo. I lighed med sejlturen på Naivasha-søen, var også denne sejltur en stor succes med et væld af fugle. Om eftermiddagen var vi igen på tur i det tørre landskab vest for søen. Her så vi bl.a flere ugle – Spotted Eagle Owl, Greyish Eagle Owl og Pearl-spotted Owlet.



Flamingoer og pelikaner ved Lake Nakuru. Foto: Troels M. Krogh.

22. september

En kort køretur på et par timer bragte os til Nakuru Nationalpark, hvor vi tilbragte resten af dagen. Få dage inden vi kom, havde der stået 300.000 flamingoer i søen, men vi måtte nøjes med godt 2000. De øvrige var desværre fløjet deres vej. Måske på grund af regnen i de senere dage? Flamingoerne i Østafrika strejfer hyppigt rundt fra den ene sø til den anden i Rift Valley alt afhængig af vandstanden i de enkelte søer.

Af fugle sås desuden krontraner samt forskellige vadefugle og terner.

Udover flamingoerne er Lake Nakuru Nationalpark især kendt som et godt sted at se næsehorn, og her levede Nakuru fuldt ud op til forventningerne, idet vi så ni næsehorn – otte hvide og et sort.


Det sorte næsehorn var et usædvanligt syn, idet den lå ned på jorden med en synlig indfalden krop og flere sår. Den så så sølle ud, at vi først troede, at den var døende, men det var åbenbart ikke tilfældet, eftersom Washington kunne fortælle os, at den det seneste halve år jævnligt var blevet set på denne måde. Der var i stedet tale om en gammel udstødt han – hos det sorte næsehorn risikerer de gamle hanner åbenbart at lide en krank skæbne, når livets afslutning nærmer sig.

Vi overnattede på Lake Nakuru Lodge, hvorfra der var en fin udsigt til flamingoflokken ved søen.

23. september

Dagens mål var Samburu – en naturperle uden lige i det nordlige Kenya. Igen i dag var det en lang køretur, men med stop undervejs. Her sås bl.a. gribbe ved en ko, der tilsyneladende var ved at dø under en fødsel.

Vi nåede frem til Samburu først på eftermiddagen. Ligesom ved Baringo imponerede det knastørre, støvede naturområde med mange forskellige fuglearter, bl.a. Vulturine



Netgiraf i Samburu. Foto: Søren Skov

Guineafowl og to arter sandhøns. Desuden sås Grevys zebraer, Beisa Oryx, den smukke netgiraf samt Stor Kudu, der er sjælden i Kenya.

Vi installerede os på den fine Samburu Simba Lodge, hvor vi skulle bo i de næste to nætter.



Vulturine Guineafowl, Samburu. Foto: Søren Skov

24. september

Samburu-området omfatter ikke kun selve Samburu Game Reserve, men også Buffalo Springs National Reserve, og det øst for liggende Shaba National Reserve. I dag fik vi besøgt to ud af de områder, idet vi fra vores lodge i Buffalo Springs National Reserve kørte til kildevældet ved Buffalo Springs, der har lagt navn til reservatet. Ved Buffalo Springs sås flere turister, der var i færd med at bade i den varme kilde. Det så hyggeligt ud, men vores fokus var på fuglene, og vi fik da også set flere fine arter – bl.a Somali Courser, hvorpå vi fortsatte til Shaba øst for landevejen.

For at sikre at der ikke skete os noget, mens vi udforskede Shaba, havde vi en bevæbnet ranger med i den ene bil – mr. Mohammed, som med sin skarpladte riffel så ud til at kunne klare enhver situation.

Vi fik set flere Somali Strudse, men desværre ingen gamle hanner. Somali Biæderen skuffede også med sit fravær, men til gengæld sås en meget fin Martial Eagle, Golden-breasted Starling og meget mere.

Blandt pattedyrene var dagens store oplevelse en leopard med killing.

25. september

Frem til middag fortsatte vi med at udforske Samburu. Vi fik nu set en fin han af Somali Struds. Måske en yngre han, idet den ikke var helt så blå på hals og lår, som de kan være. Derudover sås fine sanghøge og en enkelt Golden Pipit blev det også til.

Blandt pattedyrene vil dagen blive husket for mange gode jagttagelser af Girafantiloper og



Martial Eagle, Samburu. Foto: Søren Skov

for en fin løveflok. Her sås bl.a. en gammel han, der var næsten uden manke. De mankeløse løver i Samburu er en tilpasning til det varme, støvede ørkenklima. Efter middag kørte vi til en vestlige del af Mount Kenya, hvor vi rykkede ind på Naro Moro River Lodge.

Da vi ankom sidst på dagen til Naro Moro, fik vi ikke gjort så meget ud af den fuglerige have, men vi fik da set flere fine solfugle. Om natten hørte vi de hjerteskrærende skrig fra de lokale Tree Hyrax (trægrævlinger).

26. september

Endnu en gang morgenmad kl. 7 og afgang kl. 8. Det blev derfor kun til en kort morgenobs i haven ved Naro Moro, hvor der bl.a. sås Mountain Wagtail.

Turen gik nu til Castle Forest på den sydøstlige del af Mount Kenya. Her er der et skovreservat med urørt skov. Da vi nåede frem til Castle Forest ved middagstid, gik vi straks i gang med at udforske skoven, hvor det myldrede med spændende fugle. Bl.a. var her godt med Hartlaubs Turaco og Silvery-cheeked Hornbill.

Med flere stop undervejs kørte vi derpå langsomt frem mod Castle Forest Lodge – en lidt primitiv, men charmerende lodge i knap 3000 meters højde, hvorfra der er udsigt til Mount Kenya.

I tussmørket kom en flok Olive Ibis flyvende. Vi hørte deres karakteriske kald, men så dem desværre meget dårligt.

Det blev en grå, overskyet nat, men det havde sine fordele, da skyerne holdt på varmen.



Olive Ibis ved Castle Forest. Foto: Søren Skov

Natten blev derfor ganske behagelig og ikke så kold som frygtet. Også her kunne vi om natten høre de aparte skrig fra trægrævlingerne.

27. september.

I det tidlige morgengry hørte vi igen flokke af Olive Ibis flyve forbi hytterne. Da vi kom udenfor i det spæde morgenlys, var der stadig mange skyer, men de forsvandt hurtigt og vi kunne nu nyde synet af flere småflokke af Olive Ibis, der sad i træerne rundt om lodgen. Vi fik også et flot kig på Mount Kenya og kunne her se, at der kun er ganske lidt sne tilbage på toppen af det 5.199 meter høje bjerg.

Efter morgenmaden fortsatte vi til rejsens sidste store naturoplevelse – Nairobi Nationalpark, der er den ældste nationalpark i Kenya.

Med et areal på 120 kvadratkilometer er den blandt de mindre nationalparker i Kenya, men man skal bestemt ikke kimse af Nairobi Nationalpark. Her er storslået vild natur, der kan byde på mange fine oplevelser.

I nationalparken kan man således opleve savanne, en lille bid højlandsskov, og fine vådområder. Bl.a. kom vi forbi en sø med omkring 500 Marabou-storke foruden Openbill Stork og African Spoonbill.

Vi fik også set en enkelt løve, mange kongonier og ikke mindst hele 11 næsehorn i form af syv hvide og fire sorte. Efter mødet med det indfaldne Sorte Næsehorn i Nakuru, var det befriende at se sunde og raske sorte næsehorn.

Efter det succesrige besøg i Nairobi Nationalpark fortsatte vi til et hotel nær lufthavnen, hvor vi indtog det sidste kenyanske måltid. Derefter videre til lufthavnen, hvor der var



Sort Næsehorn i Nairobi National Park. Foto; Søren Skov

afsked med Washington og Jack.

Kl. 22.25 fløj vi med Lufthansa med kurs mod Frankfurt. Vores afrikanske eventyr var forbi.

28. september

Efter en begivenhedsløs flyrejse ankom vi til Frankfurt kl. 5.40. Herfra fortsatte vi til Kastrup Lufthavn, hvor vi ankom kl. 8.50 – mætte af mange store oplevelser og indtryk fra Kenyas enestående natur.

Fugle set på rejsen

Systematikken følger checklisten fra Cisticola Tours

Common Ostrich (*Struthio camelus*)

Masai-struds

Almindelig i den åbne savanne i Masai Mara og ved Baringo. Usædvanlig talrig i Nairobi Nationalpark, hvor vi så mindst 75 fugle. Ikke set i Samburu, hvor den afløses af nedenstående søsterart. Sås også udenfor nationalparkerne.

Somali Ostrich (*Struthio molybdophanes*)

Somali-struds

1 han og 4 hunner i Samburu.

White-faced Whistling-Duck (*Dendrocygna viduata*)

Nonnetræand

Fire fugle sås ved Keekorok, Masai Mara samt en halv snes fugle ved Lake Baringo



Somali Ostrich, Samburu. Foto: Søren Skov

Egyptian Goose (*Alopochen aegyptiaca*)

Nilgås

Almindelig. Ses på alle rejsens dage.

Yellow-billed Duck (*Anas undulata*)

Gulnæbbet And

En ret almindelig and i Kenya, men vi måtte nøjes med to observationer af henholdsvis 10 og 4 fugle.



Montane Nightjar. Foto: Søren Skov

Red-billed Duck (*Anas erythrorhyncha*)
Set ved Lake Nakuru

Rødnæbbet And

Hottentot Teal (*Anas hottentota*)
Seks fugle sås ved Lake Naivasha

Hottentotand

Cape Teal (*Anas capensis*)
Ved Lake Nakuru sås en halv snes fugle.

Kapand

Helmeted Guineafowl (*Numida meleagris*)
Almindelig på savannen. Set på 10 af rejsens dage.

Perlehøne

Vulturine Guineafowl (*Acyllium vulturinum*)
En specialitet for det tørre nordlige og østlige Kenya. Vi så omkring 100 fugle i Samburu.

Gribbeperlehøne

Crested Francolin (*Ortygornis sephaena*)
Er i Kenya en ret almindelig savanne-frankolin. Set på fire af rejsens dage.

Topfrankolin

Coqui Frankolin (*Campocolinus coqui*)
To fugle sås i Masai Mara

Coqui Frankolin

Common Quail (<i>Coturnix coturnix</i>) 1 hørt syngende ved Kinanagop Plateau	Vagtel
Jackson´s Spurfowl <i>Ptermistis jacksoni</i> 10 set Aberdares Nationalpark	Kenyabjergfrankolin
Yellow-necked Spurfowl <i>Ptermistis leucoscepus</i> Almindelig i mange savanneområder i Kenya. Vi så den bl.a. i Samburu og Nairobi Nationalpark. Sås ikke i Masai Mara, hvor den afløses af nedenstående art	Gulstrubet Sporehøne
Red-necked Spurfowl (<i>Ptermistis afer</i>) Almindelig i Masai Mara	Rødhalsset Sporehøne
Montane Nightjar (<i>Caprimulgus poliocephalus</i>) Tre fugle sås i dagslys Kinanagop Plateau, hvor de blev fremvist af vores lokalguide.	Ethiopisk Natravn
Slender-tailed Nightjar (<i>Caprimulgus clarus</i>) To fugle sås i dagslys Baringo. Også her blev de fremvist af en lokalguide.	Kilehalenatravn
Scarce Swift <i>Schoutedenapus myoptilus</i> Et halvt hundrede sås over skoven ved Castle Forest	Tågeskovsejler
African Palm-Swift (<i>Cypsiurus parvus</i>) Almindelig. Set på syv af rejsens dage,	Afrikansk Palmesejler
Mottled Swift (<i>Tachymarptis aequatorialis</i>) Set på fem af rejsens dage.	Skællet Alpesejler
Alpine Swift (<i>Tachymarptis melba</i>) Mindst 20 fugle over skoven ved Castle Forest.	Alpesejler
Little Swift (<i>Apus affinis</i>) Meget almindelig. Især i byer og ved bygninger. Set på 13 af rejsens dage - ofte i trecifrede antal.	Lille Sejler
White-rumped Swift (<i>Apus caffer</i>) Enkelte fugle sås på tre af rejsens dage.	Kaffersejler
Nyanza Swift (<i>Apus niansae</i>) Almindelig. Set på syv af rejsens dage.	Nyanzasejler
Common Swift <i>Apus apus</i> 200 sås ved Aberdares, hvor de i småflokke trak aktivt mod syd.	Mursejler



Great Blue Turaco, Kakamega. Foto: Søren Skov

Great Blue Turaco (*Corythaeola cristata*)

Kæmpeturako

Vi så 3 - 5 fugle fint i Kakamega-skoven

Bare-faced Go-away-bird (*Corythaixoides personatus*)

Maskelarmfugl

Almindelig i Masai Mara. Set på fire af rejsens dage. Afløser White-bellied Go-Away-bird i det vestligste Kenya.

White-bellied Go-away-bird (*Corythaixoides leucogaster*)

Hvidbuget Larmfugl

Almindelig på savannen i det centrale, nordlige og østlige Kenya. Set på syv af rejsens dage.

Ross Turaco *Tauraco rossae*

Gulmasket Turako

To fugle sås fint ved et stop mellem Kakamega og Baringo.

White-crested Turaco (*Tauraco leucolophus*)

Hvidtoppet Turako

To fugle sås fint ved et stop mellem Kakamega og Baringo.

Black-billed Turaco (*Tauraco hartlaubi*)

Sortnæbbet Turako

To fugle sås i Kakamega-skoven



Hartlaub`s Bustard. Foto: Ingelise Petersen

Hartlaub's Turaco (*Tauraco hartlaubi*)

Hartlaub's Turako

Allerede den første morgen sås en fugl ved Wildebeest Camp i udkanten af Nairobi.
Desuden sås en halv snes fugle ved Castle Forest.



Buff-crested Bustard, Samburu. Foto: Søren Skov

Kori Bustard (*Ardeotis kori*)

To fugle sås i Masai Mara

Koritrappe

White-bellied Bustard (*Eupodotis senegalensis*)

Ret almindelig i Masai Mara og Samburu

Rusttoppet Trappe

Buff-crested Bustard (*Eupodotis gindiana*)

4 fugle sås i Samburu.

Okkertoppet Trappe

Black-bellied Bustard (*Lissotis melanogaster*)

I Masai Mara sås i alt 12 fugle. Desuden sås en enkelt ved Nakuru.

Sortbuget Trappe

Hartlaubs Bustard *Lissotis hartlaubii*

En enkelt sås i Nairobi Nationalpark

Sølvtrappe

White-browed Coucal (*Centropus superciliosus*)

Set på fire af rejsens dage.

Hvidbrynet Sporegøg



Black-faced Sandgrouse, Samburu. Foto: Søren Skov

Jacobin Cuckoo (*Clamator jacobinus*)
To iagttagelser – begge af en enkelt fugl

Jacobinergøg

Red-chested Cuckoo (*Cuculus solitarius*)
Set og hørt på tre af rejsens dage.

Eremitgøg

Dideric Cuckoo (*Chrysococcyx caprius*)
Ret almindelig. Set og hørt på fire af rejsens dage.

Smaragdøg

Klaas's Cuckoo (*Chrysococcyx klaas*)
Set på to af rejsens dage.

Hvidbuget Smaragdøg

Chestnut-bellied Sandgrouse (*Pterocles exustus*)
50 Samburu

Brunbuget Sandhøne

Yellow-throated Sandgrouse (*Pterocles gutturalis*)
10 Masai Mara

Gulstrubet Sandhøne

Black-faced Sandgrouse (*Pterocles decoratus*)
I alt sås 5 ved Baringo og 25 i Samburu-området

Hvidbrystet Sandhøne

Rock Pigeon (<i>Columba livia</i>) Forvildede tamduer sås i flere byer, bl.a. Nairobi og Nakuru	Klippedue
Speckled Pigeon (<i>Columba guinea</i>) Almindelig. Ses især ved bygninger og i byer. Set på 13 af rejsens dage.	Guineadue
African Olive Pigeon (<i>Columba arquatrix</i>) Sås i skoven ved Castle Forest	Olivendue
Eastern Bronze-naped Pigeon (<i>Columba delegorguei</i>) Sås i skoven ved Castle Forest	Nataldue
Ring-necked Dove (<i>Streptopelia capicola</i>) En karakterfugl i den tørre savanne. Set på 12 af rejsens dage.	Savanneskoggerdue
Red-eyed Dove (<i>Streptopelia semitorquata</i>) Almindelig i frodig bevoksning såsom skov, galleriskov, haver ved lodges mv. Set på 13 af rejsens dage.	Røddøjet Skoggerdue
African Mourning Dove (<i>Streptopelia decipiens</i>) Almindelig i tør savanne i den nordlige del af Kenya. Set på 4 af rejsens dage.	Guløjet Skoggerdue
Laughing Dove (<i>Streptopelia senegalensis</i>) Almindelig. Set på 10 af rejsens dage.	Senegaldue
Emerald-spotted Wood-Dove (<i>Turtur chalcospilos</i>) Almindelig i den tørre savanne. Set/hørt på 11 af rejsens dage.	Smaragdpletdue
Blue-spotted Wood-Dove (<i>Turtur afer</i>) En skovfugl. Ret almindelig i Kakamega, hvor vi så og hørte flere fugle.	Stålpiletue
Tambourine Dove (<i>Turtur tympanistria</i>) Set/hørt i Kakamega samt ved Aberdares og i bjergregnskoven på Mt. Kenya ved Castle Forest.	Tamborindue
Namaqua Dove (<i>Oena capensis</i>) En tørlandsart. Set ved både Baringo og i Samburu	Namaquadue
African Green-Pigeon (<i>Treron calvus</i>) Flere sås i parken ved Keekorok i Masai Mara.	Papegøjedue
White-spotted Flufftail <i>Serothura pulchra</i> 1 set Kakamega	Hvidpletlet Dunhale



Krontrane ved Lake Nakuru. Foto: Søren Skov

Common Moorhen (*Gallinula chloropus*)

Tre fugle sås ved Naivasha

Grønbenet Rørhøne

Red-knobbed Coot (*Fulica cristata*)

Set på to af rejsens dage. Det højeste antal var 300 ved en sø i højlandet på vej til Naivasha.

Kamblishøne

African Swamphen (*Porphyrio madagascariensis*)

Fem fugle sås ved Baringo. Blev førhen regnet som en race af Sultanhøne.

Grønrygget Sultanhøne

- Black Crake** (*Amaurornis flavirostra*) Sort Rørvagtel
Ret almindelig i vådområder. Set på fem af rejsens dage.
- Grey Crowned-Crane** (*Balearica regulorum*) Grå Krontrane
Ret lokal og ikke så almindelig, som den har været. Set på fire af rejsens dage.
- Little Grebe** (*Tachybaptus ruficollis*) Lille Lappedykker
Alm. i søerne i Rift Valley. Vi så mindst 200 Naivasha-søen. Sås også i Lake Nakuru og Lake Baringo
- Lesser Flamingo** (*Phoenicopterus minor*) Lille Flamingo
Talrig ved saltsøerne i Rift Valley, men de store flokke flytter meget rundt fra sted til sted. Vi så mindst 2000 ved Lake Nakuru. Desuden sås fra bil og på lang afstand tusinder af flamingoer ved Lake Elmentaita, hvoraf hovedparten formentlig var denne art.
- Greater Flamingo** (*Phoenicopterus roseus*) Flamingo
15 Naivasha-søen og 50 Lake Nakuru.
- Senegal Thick-knee** (*Burhinus senegalensis*) Senegaltriel
To fugle sås ved Lake Baringo. En nordlig art, der kun forekommer i det nordvestlige Kenya – bl.a. ved Baringo, hvor man kan se både Senegal og Water Thick-knee.
- Water Thick-knee** (*Burhinus vermiculatus*) Vandtriel
Set på to af rejsens dage med i alt tre fugle. Vidt udbredt ved vådområder i Kenya.
- Spotted Thick-knee** (*Burhinus capensis*) Plettet Triel
En tørlands-triel, der er ret almindelig, men svær at se. Vi så 2 Baringo og 2 Nairobi Nationalpark.
- Black-winged Stilt** (*Himantopus himantopus*) Stylteløber
Almindelig i vådområder. Set på syv af rejsens dage.
- Pied Avocet** (*Recurvirostra avosetta*) Klyde
30 Lake Nakuru
- Long-toed Lapwing** (*Vanellus crassirostris*) Langtået Vibe
20 Lake Naivasha
- Blacksmith Plover** (*Vanellus armatus*) Broget Vibe
Almindelig ved vådområder. Set på syv af rejsens dage
- Spur-winged Plover** (*Vanellus spinosus*) Sporevibe
Almindelig. Set på ni af rejsens dage.



Long-toed Lapwing, Lake Naivasha. Foto: Søren Skov

Black-winged Lapwing (*Vanellus melanopterus*)

Lys Sørgevibe

Knyttet til græsdomineret savanne i højlandet. Vi så 8 fugle i Masai Mara.

Crowned Lapwing (*Vanellus coronatus*)

Kronvibe

Knyttet til tørre områder og åbne savanner. Set på syv af rejsens dage.

African Wattled Lapwing (*Vanellus senegallus*)

Savanne Lapvibe

6 Masai Mara

Common Ringed Plover (*Charadrius hiaticula*)

Stor Præstekrave

Set ved de store søer i Rift Valley. Det største antal var 20 Lake Nakuru.

Kittlitz's Plover (*Charadrius pecuarius*)

Kittlitz's Præstekrave

I alt sås tre fugle ved søerne i Rift Valley.

Three-banded Plover (*Charadrius tricollaris*)

Trebåndet Præstekrave

Almindelig ved små og store vådområder. Set på otte af rejsens dage.

Ruddy Turnstone (*Arenaria interpres*)

Stenvender

2 Lake Nakuru



Three-banded Plover, Masai Mara. Foto: Søren Skov

African Jacana (*Actophilornis africanus*)

Afrikansk Bladhøne

Ret almindelig i vådområder. Set på fem af rejsens dage. Det højeste antal var 100 Lake Naivasha

Black-tailed Godwit (*Limosa limosa*)

Stor Kobbersneppe

50 Lake Naivasha

Curlew Sandpiper (*Calidris ferruginea*)

Krumnæbbet Ryle

6 Lake Naivasha.

Little Stint (*Calidris minuta*)

Dværgryle

En ret almindelig træk-og vintergæst ved søerne i Rift Valley. Set på tre af rejsens dage. Det højeste antal var 20 Lake Nakuru

Ruff (*Philomachus pugnax*)

Brushane

15 Lake Naivasha.

Common Snipe (*Gallinago gallinago*)

Dobbeltbekkasin

1 Nairobi Nationalpark.



Temminck's Courser, Masai Mara. Foto Søren Skov

Common Sandpiper (<i>Actitis hypoleucos</i>) Almindelig ved vandløb og søer. Set på ni af rejsens dage.	Mudderklire
Green Sandpiper (<i>Tringa ochropus</i>) Ret almindelig ved vandløb og mindre søer. Set på fem af rejsens dage.	Svaleklire
Wood Sandpiper (<i>Tringa glareola</i>) Almindelig ved vådområder. Set på fem af rejsens dage.	Tinksmed
Marsh Sandpiper (<i>Tringa stagnatilis</i>) Fåttalig. Set på fire af rejsens dage. Det højeste antal var 4 Lake Naivasha.	Damklire
Common Greenshank (<i>Tringa nebularia</i>) Ret almindelig. Set på seks af rejsens dage.	Hvidklire
Temminck's Courser (<i>Cursorius temminckii</i>) I Masai Mara sås i alt ni fugle	Sortøret Ørkenløber
Somali Courser (<i>Cursorius somalensis</i>) Fem fugle ved Buffalo Springs, Samburu.	Somaliørkenløber

Three-banded Courser (*Rhinoptilus cinctus*) Mangebåndet Ørkenløber
To fugle sås fint Baringo. Kaldes i mange fuglebøger for Heuglin's Courser.

Black-headed Gull *Chroicocephalus ridibundus* Hættemåge
Tre fugle sås ved Naivasha-søen

Grey-hooded Gull (*Chroicocephalus cirrocephalus*) Gråhovedet Måge
200 Naivasha-søen, 15 Lake Baringo

Gull-billed Tern (*Gelochelidon nilotica*) Sandterne
Sås ved søerne i Rift Valley. I alt noterede vi den på fire af rejsens dage. Det højeste antal var 20 Lake Nakuru.

White-winged Tern (*Chlidonias leucopterus*) Hvidvinget Terne
Enkelte sås ved Lake Naivasha og Lake Nakuru. Er en talrig vintergæst, men i september er det kun ganske få fugle, der ses i Kenya.

Whiskered Tern (*Chlidonias hybrida*) Hvidskægget Terne
Også denne art sås ved Lake Naivasha og Lake Nakuru. Dog kun nogle få individer. Til gengæld var to i sommerdragt, da den yngler i Østafrika.

Yellow-billed Stork (*Mycteria ibis*) Afrikansk Skovstork
Almindelig i vådområder. Set på 10 af rejsens dage. Det højeste antal var 20 Lake Nakuru.

African Openbill (*Anastomus lamelligerus*) Afrikansk Gabenæb
Syv fugle sås i Nairobi Nationalpark

Woolly-necked Stork (*Ciconia episcopus*) Uldhalsstork
Set i Masai Mara og Samburu. I alt sås ni fugle.

White Stork (*Ciconia ciconia*) Hvid Stork
En enkelt fugl sås under bilkørsel.

Saddle-billed Stork (*Ephippiorhynchus senegalensis*) Sadelnæb
I alt sås fire fugle i Masai Mara.

Marabou Stork (*Leptoptilos crumeniferus*) Maraboustork
Meget almindelig. Set på 11 af rejsens dage. Det højeste antal var 500 Nairobi Nationalpark.

African Darter (*Anhinga rufa*) Afrikansk Slangehalsfugl
3 Lake Nakuru, 100 Lake Baringo og en enkelt i Nairobi Nationalpark

Long-tailed Cormorant (*Phalacrocorax africanus*) Rørskarv
Sås ret almindeligt. Set på syv af rejsens dage. Det højeste antal var 75 Lake Naivasha



Ved en sø i Nairobi National park var Marabustorke her, der og alle vegne. Både på jorden....Foto: Søren Skov



Marabou stork

....og i luften. Foto: John Hansen



Long-tailed Cormorant, Lake Naivasha. Foto: Søren Skov

White-breasted Cormorant (*Phalacrocorax lucidus*) Hvidbrystet Skarv
 Almindelig i søerne i Rift Valley. Set på otte af rejsens dage. Det højeste antal var 1000
 Lake Naivasha. Regnes af nogle eksperter som en race af vores egen europæiske Skarv -
Phalacrocorax carbo.

African Sacred Ibis (*Threskiornis aethiopicus*) Hellig Ibis
 Almindelig. Set på 10 af rejsens dage. Det højeste antal var 150 Lake Naivasha.

Glossy Ibis (*Plegadis falcinellus*) Sort Ibis
 Set ved Lake Naivasha.

Olive Ibis (*Bostrychia olivacea*) Olivenibis
 En fåtallig og sjælden set skovibis, der i Kenya kun forekommer i højlandets
 bjergregnskove. Vi så 10-15 fugle ved Castle Forest.

Hadada Ibis (*Bostrychia hagedash*) Hadadaibis
 Almindelig. Set på 12 af rejsens dage

African Spoonbill (*Platalea alba*) Afrikansk Skestork
 Set på fire af rejsens dage. Det højeste antal var 15 Nairobi Nationalpark.

Black-crowned Night-Heron (*Nycticorax nycticorax*) Nathejre
 Set på to af rejsens dage. Det højeste antal var 10 Lake Naivasha

- Striated Heron** (*Butorides striata*) Mangrovehejre
Ret almindelig. Set på seks af rejsens dage.
- Squacco Heron** (*Ardeola ralloides*) Tophejre
Lokalt ret almindelig. Set på fem af rejsens dage. De højeste antal var 15 Lake Naivasha.
- Western Cattle Egret** (*Bubulcus ibis*) Kohejre
Almindelig. Set på 10 af rejsens dage. Set både på savannen, hvor den følger de store vilde pattedyr, samt i kulturlandskabet, hvor den følger tamkvæg.
- Grey Heron** (*Ardea cinerea*) Fiskehejre
Almindelig i vådområder. Set på seks af rejsens dage.
- Black-headed Heron** (*Ardea melanocephala*) Sorthovedet Hejre
Almindelig i tørt land. Set på 10 af rejsens dage.
- Goliath Heron** (*Ardea goliath*) Goliathejre
Set på seks af rejsens dage.
- Purple Heron** (*Ardea purpurea*) Purpurhejre
Blot tre fugle i alt.
- Great Egret** (*Ardea alba*) Sølvhejre
Almindelig i vådområder. Set på fem af rejsens dage. Det højeste antal var 15 Lake Naivasha.
- Intermediate Egret** (*Egretta intermedia*) Mellemhejre
Mere fåtallig end sølvhejren, men sås ligeledes på fem af rejsens dage.
- Black Heron** *Egretta ardesica* Skyggehejre
Fåtallig. Set på fire af rejsens dage. Det største antal var tre fugle ved Lake Naivasha.
- Little Egret** (*Egretta garzetta*) Silkehejre
Almindelig i vådområder. Set på fem af rejsens dage. Det højeste antal var 10 Lake Naivasha.
- Hamerkop** (*Scopus umbretta*) Hammerhoved
Almindelig. Set på 13 af rejsens dage.
- Great White Pelican** (*Pelecanus onocrotalus*) Hvid Pelikan
Almindelig i søerne i Rift Valley. Set på fem af rejsens dage.
- Pink-backed Pelican** (*Pelecanus rufescens*) Rosapelikan
Almindelig. Set på fem af rejsens dage. Det største antal var 75 Lake Baringo.



Dramatik ved et ådsel af Thomsons Gazelle i Masai Mara. To øregribbe kommer flyvende til ådslet, og da de er største gribbe i Afrika, er de øverst i hierarkiet. Til venstre ses Hvidrygget Grib og til højre en Marabou. Foto: Søren Skov

Secretary-bird (*Sagittarius serpentarius*)

Sekretærfugl

Overraskende mange i Masai Mara, hvor vi så omkring 30 fugle. Desuden sås en enkelt i Nakuru Nationalpark.

Black-shouldered Kite (*Elanus caeruleus*)

Blå Glente

Ret almindelig - især på udyrkede områder i det centrale højjland. Set på seks af rejsens dage.

African Harrier-Hawk (*Polyboroides typus*)

Afrikansk Klatrehøg

Set på to af rejsens dage med i alt fire fugle.

Hooded Vulture (*Necrosyrtes monachus*)

Hættegrib

Blot to fugle set i alt.

White-backed Vulture (*Gyps africanus*)

Hvidrygget Grib

Almindelig. Set på otte af rejsens dage. Flere steder så vi den på rede i høje træer.

Ruppell's Griffon Vulture (*Gyps rueppellii*)

Savannegrib

Noget mere fåtallig end White-backed Vulture. Set på seks af rejsens dage.



Crowned Eagle ynglede i parken ved Ronda Retreat, Kakamega. Foto: Søren Skov

Lappet-faced Vulture (*Torgos tracheliotus*)
Kun set i Masai Mara og Samburu.

Øregrib

White-headed Vulture (*Trigonoceps occipitalis*)
En enkelt fugl sås fint i Samburu.

Hvidhovedet Grib

Black-breasted Snake-Eagle (*Circaetus pectoralis*)
I alt sås tre fugle i Masai Mara.

Hvidbuget Slangeørn

Brown Snake-Eagle (*Circaetus cinereus*)
I Masai Mara sås en enkelt fugl, mens vi i Samburu så to fugle.

Mørk Slangeørn

Southern Banded Snake Eagle (*Circaetus fasciolatus*)
En enkelt fugl sås i Masai Mara

Båndslangeørn

Bateleur (*Terathopius ecaudatus*)

Gøglerørn

Ret almindelig på savannen i nationalparker med urørt natur. Set på seks af rejsens dage.

Crowned Eagle *Stephanoaetus coronatus*

Kronørn

1-2 fugle sås ved rede i parken ved Rondo Retreat, Kakamega. Desuden sås en flyvende ved Castle Forest



Tawny Eagle, Samburu. Foto: Søren Skov

- Martial Eagle** (*Polemaetus bellicosus*) Kampørn
I alt sås tre fugle. Især huskes den fine jagttagelse i Samburu, hvor vi så en gammel fugl på nært hold siddende i et træ med bytte.
- Long-crested Eagle** (*Lophaetus occipitalis*) Topørn
I alt sås fem fugle.
- Wahlbergs Eagle** (*Aquila wahlbergi*) Savanneørn
Set på seks af rejsens dage.
- Tawny Eagle** (*Aquila rapax*) Rovørn
Almindelig. Set på 10 af rejsens dage med 1-5 fugle om dagen.
- African Hawk-Eagle** (*Aquila spilogaster*) Afrikansk Høgeørn
To fugle sås i Samburu.
- Dark Chanting-Goshawk** (*Melierax metabates*) Mørk Sanghøg
1 Masai Mara – afløser nedenstående søsterart på savanne i det vestlige Kenya.
- Eastern Chanting-Goshawk** (*Melierax poliopterus*) Somalisanghøg
Ret almindelig på savanne i det nordlige og østlige Kenya. Vi så den på tre af rejsens dage med i alt syv fugle – heraf fem i Samburu.
- African Goshawk** (*Accipiter tachiro*) Afrikansk Duehøg
En skovfugl. Vi så en enkelt ved Castle Forest



Eastern Chanting Goshawk, Samburu. Foto: Søren Skov



Long-crested Eagle, Castle Forest. Foto: Søren Skov

- Little Sparrowhawk** (*Accipiter minutus*) Afrikansk Spurvehøg
En enkelt iagttagelse i Nairobi Nationalpark
- Black Sparrowhawk** (*Accipiter melanoleucus*) Afrikansk Skovhøg
En enkelt sås ved Castle Forest
- Yellow-billed Kite** (*Milvus paraciticus*) Gulnæbbet Glente
Meget almindelig - især ved byerne. Set på 11 af rejsens dage med op til 50 fugle om dagen. Alle fugle var af den gulnæbbede afrikanske form *paraciticus*, der i dag regnes for en selvstændig art, men indtil for nyligt blev regnet som en race af Sort Glente.
- African Fish-Eagle** (*Haliaeetus vocifer*) Afrikansk Flodørn
Almindelig ved søerne i Rift Valley. Set på seks af rejsens dage. Det højeste antal var mindst 30 ved Lake Naivasha, der huser verdens tætteste ynglebestand af denne art.
- Mountain Buzzard** (*Buteo oreophilus*) Bjergvåge
To fugle i alt - en ved Aberdares og en Mt. Kenya ved Castle Forest
- Augur Buzzard** (*Buteo augur*) Augurvåge
Almindelig. Set på 10 af rejsens dage med op til 6 fugle om dagen.
- Pearl-spotted Owlet** (*Glaucidium perlatum*) Plettet Spurveugle
To fugle set fint ved Baringo.
- Northern White-faced Scops-Owl** (*Otus leucotis*) Hvidmasket Dværghornugle
En fugl set ved Baringo.
- Greyish Eagle-Owl** *Bubu cinarescens* Grå Hornugle
To fugle sås ved Baringo. Blev tidligere regnet for en race af Spotted Eagle Owl.
- Spotted Eagle-Owl** (*Bubo africanus cinarescens*) Plettet Hornugle
En set ved Baringo.
- Cape Eagle Owl** (*Bubu capensis mackinderi*) Kaphornugle
En fugl sås meget fint i en kløft i højlandet, hvor den blev fremvist af en lokal guide. Racen i Østafrika bliver af mange eksperter regnet som en anden art end den mindre race, der kan ses i Sydafrika. I så fald er vores fugl: **Mackinder's Eagle-Owl** *Bubu mackinderi* - Bjerghornugle
- Speckled Mousebird** (*Colius striatus*) Brun Musefugl
Almindelig - ses især i frodigt krat. Set på 12 af rejsens dage.
- Blue-naped Mousebird** (*Urocolius macrourus*) Blånakket Musefugl
Almindelig i tør savanne. Set på fire af rejsens dage (Baringo og Samburu).



Specked Mousebird, Nairobi National Park. Foto Søren Skov



Southern Ground Hornbill, Masai Mara. Foto: Søren Skov

White-headed Mousebird (*Colius leucocephalus*) Hvidhovedet Musefugl
 En halv snes fugle sås i Samburu. Er i Kenya knyttet til den tørre savanne i den nordlige og østlige del af landet.

Bar-tailed Trogon (*Apaloderma vittatum*) Blåbrystet Trogon
 Hørt i skoven ved Lake Nakuru

African Hoopoe (*Upupa africana*) Afrikansk Hærfugl
 Almindelig. Set på syv af rejsens dage.

Green Wood-hoopoe (*Phoeniculus purpureus*) Purpurskovhærfugl
 Lokalt almindelig. Set på tre af rejsens dage. Ses gerne i flokke.

Grant's Wood-hoopoe (*Phoeniculus granti*) Grant's Skovhærfugl
 To fugle sås ved Shaba i Samburu-området. Blev tidligere regnet for en race af den sydafrikanske Violet Wood-hoopoe.

Common Scimitar-bill (*Rhinopomastus cyanomelas*) Seglhærfugl
 Set i Samburu

Abyssinian Scimitar-bill (*Rhinopomastus minor*) Rødnæbbet Seglhærfugl
 En enkelt iagttagelse ved Baringo



Black-and-White-Casqued Hornbill, Kakamega. Foto: Søren Skov

Southern Ground-Hornbill (*Bucorvus leadbeateri*)

Kafferhornravn

I alt sås mindst syv fugle i Masai Mara. Bl.a. sås tre i parken ved Keekorok Lodge.

Northern Red-billed Hornbill (*Tockus erythrorhynchus*)

Rødnæbbet Toko

Almindelig. Set på fem af rejsens dage.

Von der Decken's Hornbill (*Tockus deckeni*)

Sortvinget Toko

Sås i Masai Mara og Samburu.

Jackson's Hornbill (*Tockus jacksonii*)

Savannetoko

Flere fugle sås i Baringo-området. Er tæt beslægtet med Von der Decken's Hornbill, som den erstatter i det nordvestlige Kenya.

Eastern Yellow-billed Hornbill (*Tockus flavirostris*)

Gulnæbbet Toko

Set i Samburu.

African Grey Hornbill (*Tockus nasutus*)


Grå Toko

Set på fire af rejsens dage.

Crowned Hornbill (*Tockus alboterminatus*)

Krontoko

Set ved Castle Forest.



Pied Kingfisher, Baringo, Foto Søren Skov



Giant Kingfisher, Baringo. Foto; Søren Skov

Hemprich's Hornbill (*Lophoceros hemprichi*)

Abessinsk Toko

To fugle sås ved Baringo

Silvery-cheeked Hornbill (*Bycanistes brevis*)

Sølvkindet Hornfugl

Ved Castle Forest sås mindst 10 fugle.

Black-and-White-Casqued Hornbill (*Bycanistes subcylindricus*)

Gråkindet Hornfugl

Almindelig i Kakamega-skoven.

Purple Roller (*Coracias noevius*)

Blåvinget Ellekrage

Set på fire af rejsens dage. Foretrækker mere tør savanne end Lilac-breasted Roller. Hed tidligere Rufous-crowned Roller.

Lilac-breasted Roller (*Coracias caudatus*)

Lillabrystet Ellekrage

Almindelig på savannen - især i nationalparker med urørt natur. Set på 11 af rejsens dage.

Broad-billed Roller (<i>Eurystomus glaucurus</i>) En fugl sås fint i skoven ved Lake Nakuru. Foretrækker frodig skov	Rosaellekrage
Grey-headed Kingfisher (<i>Halcyon leucocephala</i>) Set på fire af rejsens dage. En tørlands-isfugl.	Gråhovedet Isfugl
Striped Kingfisher (<i>Halcyon chelicuti</i>) Set på tre af rejsens dage. Ligeledes en tørlands-isfugl.	Stribet Isfugl
Woodland Kingfisher (<i>Halcyon senegalensis</i>) En enkelt fugl sås ved vores lodge i Baringo. Også denne art er en tørlands-isfugl.	Skovisfugl
Malachite Kingfisher (<i>Alcedo cristata</i>) Tilknyttet vådområder. Set på tre af rejsens dage med i alt fem fugle.	Malakitisfugl
Giant Kingfisher (<i>Megaceryle maxima</i>) Set på fire af rejsens dage med i alt syv fugle. Højeste antal var 3 Lake Naivasha.	Kæmpestødfisker
Pied Kingfisher (<i>Ceryle rudis</i>) Almindelig. Set på otte af rejsens dage. Det højeste antal var 50 Lake Naivasha.	Gråfisker
Blue-headed Bee-eater (<i>Merops muelleri</i>) To til tre fugle sås i Kakamega. Det eneste sted, hvor denne fine skov-biæder yngler i Østafrika.	Brunrygget Biæder
Little Bee-eater (<i>Merops pusillus</i>) Almindelig på savannen. Set på syv af rejsens dage med op til 10 fugle om dagen	Dværgbiæder
Cinnamon-chested Bee-eater (<i>Merops oreobates</i>) Almindelig i skovene i det centrale højlend samt i Kakamega. Set på seks af rejsens dage.	Okkerbrystet Biæder
White-fronted Bee-eater (<i>Merops bullockoides</i>) Tre spredte iagttagelser af 1-2 fugle.	Hvidpandet Biæder
White-throated Bee-eater (<i>Merops albicollis</i>) Set på tre af rejsens dage.	Hvidstrubet Biæder
Olive Bee-eater (<i>Merops superciliosus</i>) 30 fugle sås ved Lake Baringo.	Madagascar Biæder
European Bee-eater (<i>Merops apiaster</i>) Almindelig. Set på seks af rejsens dage.	Europæisk Biæder
Grey-throated Barbet (<i>Gymnobucco bonapartei</i>) Almindelig i Kakamega	Gråstrubet Skægfulg



Little Bee-eater, Nairobi National Park. Foto: Søren Skov

Moustached Tinkerbird (*Pogoniulus leucomyxtax*)
1 Mount Kenya

Skægget Tinkerfugl

Yellow-rumped Tinkerbird (*Pogoniulus bilineatus*)
Set og især hørt i Kakamega. Hørtes også i Castle Forest på Mt. Kenya.

Gulgumpet Tinkerfugl

Red-fronted Tinkerbird (*Pogoniulus pusillus*)
Fire spredte iagttagelser.

Rødpandet Tinkerfugl

Yellow-spotted Barbet (*Buccanodon duchaillui*)
Flere sås og hørtes i Kakamega.

Gulspættet Skægfugl

Red-fronted Barbet (*Tricholaema diademata*)
En enkelt iagttagelse

Diademskægfugl

Spot-flanked Barbet (*Tricholaema lacrymosa*)
To spredte iagttagelser.

Dråbeskægfugl



Nubian Woodpecker, hun. Keekorok, Masai Mara. Foto: Søren Skov

Black-throated Barbet (*Tricholaema melanocephala*)

Set på tre af rejsens dage.

Sortkronet Skægfulg

White-headed Barbet (*Lybius leucocephalus*)

1 Naivasha

Hvidhovedet Tandskægfulg

Yellow-billed Barbet (*Trachyphonus purpuratus*)

Set fugle i Kakamega.

Gulnæbbet Perleskægfulg

Black-billed Barbet (*Lybius guifsobalito*)

En enkelt iagttagelse

Sortnæbbet Tandskægfulg

Red-and-yellow Barbet (*Trachyphonus erythrocephalus*)

Set på to af rejsens dage.

Pragtperleskægfulg

D'Arnaud's Barbet (*Trachyphonus darnaudii*)

Sås ved Baringo.

Perleskægfulg

Usambiro Barbet (*Trachyphonus usambiro*)

Almindelig i Masai Mara.

Usambiro-skægfulg

Green-backed Honeybird (<i>Prodoliscus zambesiae</i>) En enkelt iagttagelse.	Grønrygget Honninggøg
Lesser Honeyguide (<i>Indicator minor</i>) En enkelt fugl sås i skoven ved Nakuru	Gråbrystet Honninggøg
Greater Honeyguide (<i>Indicator indicator</i>) To fugle sås ved Baringo.	Sortstrubet Honninggøg
Buff-spotted Woodpecker (<i>Pardipicus nivosus</i>) To fugle sås i Kakamega	Hvidpletet Spætte
Brown-eared Woodpecker (<i>Pardipicus caroli</i>) En enkelt fugl sås i Kakamega	Brunøret Spætte
Nubian Woodpecker (<i>Campethera nubica</i>) Almindelig. Set på fem af rejsens dage.	Nubisk Spætte
Tullberg's Woodpecker (<i>Campethera tullbergi</i>) En enkelt iagttagelse Castle Forest, Mount Kenya,	Bjergspætte
Bearded Woodpecker (<i>Dendropicos namaquus</i>) Set på to af rejsens dage	Skægspætte
Cardinal Woodpecker (<i>Dendropicos fuscescens</i>) Set på fire af rejsens dage.	Kardinalspætte
Yellow-crested Woodpecker (<i>Dendropicos xantholophus</i>) 1 Kakamega.	Gulkronet Spætte
Eastern Grey Woodpecker (<i>Dendropicos spodocephalus</i>) Set på fem af rejsens dage.	Rødbuget Askespætte
Pygmy Falcon (<i>Polihierax semitorquatus</i>) En enkelt sås i Masai Mara.	Afrikansk Pygmæfalk
Grey Kestrel (<i>Falco ardosiaceus</i>) Tre fugle sås i Masai Mara	Grå Tårnfalk
Lanner Falcon (<i>Falco biarmicus</i>) Almindelig. Vi så hele 13 Lannerfalke fordelt på seks af rejsens dage.	Lannerfalk
Red-fronted Parrot (<i>Poicephalus gulielmi</i>) Overflyvende fugle sås ved både Castle Forest og Naro Moro, Mount Kenya	Congopapegøje



Slate-colored Boubou, Baringo. Foto: Søren Skov

Brown Parrot (*Poicephalus meyeri*)

Meyers Papegøje

En enkelt fugl sås Masai Mara samt ligeledes en enlig fugl Naivasha. Kaldes også Brown Parrot.

Red-bellied Parrot (*Poicephalus rufiventris*)

Rødbuget Brunpapegøje

Er normalt ret almindelig på savannen i det nordlige og østlige Kenya. Vi så den dog kun i Samburu. Kaldes også for Orange-bellied Parrot.

Fischer's/Yellow-collared Lovebird (*Agapornis fischeri/ personatus*)

Forvildede hybrider af disse to dværgpapegøjer, der lever vildt i Tanzania, men er udsatte i Kenya, sås flere steder, bl.a. ved Naivasha

African Broadbill (*Smithornis capensis*)

Afrobrednæb

Tre fugle sås/hørtes i Kakamega-skoven.

Chin-spot Batis (*Batis molitor*)

Brunstrubet Batis

Almindelig. Set på fem af rejsens dage.

Pygmy Batis (*Batis perkeo*)

Pygmæbatis

Set i det tørre nordlige og østlige Kenya. Vi så fire fugle i Samburu og en ved Baringo

Chestnut Wattle-eye (<i>Platysteira castanea</i>) En enkelt sås i Kakamega	Kastaniebrun Lapøje
Brown-throated Wattle-eye (<i>Platysteira cyanea</i>) I Kakamega sås/hørtes tre fugle	Brunstrubet Lapøje
Jameson´s Wattle-eye (<i>Platysteira jamesoni</i>) En enkelt iagttagelse i Kakamega-skoven	Zairelapøje
Bocage´s Bush-shrike (<i>Malaconotus bocageri</i>) Almindelig i Kakamega.	Grågrøn Busktornskade
Orange-breasted Bush-shrike <i>Malaconotus sulfureopectus</i> To fugle sås og hørtes ved Baringo	Svovlbrystet Busktornskade
Brown-crowned Tchagra (<i>Tchagra australis</i>) Set på tre af rejsens dage.	Brunkronet Kratskade
Three-streaked Tchagra (<i>Tchagra jacksoni</i>) Set ved Baringo	Lyshovedet Kratskade
Slate-colored Boubou (<i>Laniarius funebris</i>) Almindelig i tør savanne. Set på seks af rejsens dage.	Sodbubu
Tropical Boubou (<i>Laniarius aethiopicus</i>) Almindelig i frodig vegetation. Set og ikke mindst hørt på ni af rejsens dage.	Bubu
Lühder´s Bush Shrike (<i>Laniarius luhderi</i>) Flere sås i Kakamega.	Brunkronet Busktornskade
Brubru (<i>Nilaus afer</i>) Set på fem af rejsens dage.	Nilaus
White-crested Helmetshrike (<i>Prionops plumatus</i>) Set ved Baringo og Samburu	Hvidtoppet Hjelmtornskade
Grey Cuckoo-shrike (<i>Coracina caesia</i>) To fugle sås ved Mount Kenya	Ensfarvet Gråfugl
Black Cuckoo-shrike (<i>Campephaga flava</i>) Ret almindelig. Set på fire af rejsens dage.	Sort Larveæder
Petit´s Cuckoo-Shrike (<i>Campephaga petiti</i>) En enkelt fugl sås i Kakamega	Glanslarveæder

Purple-throated Cuckoo-Shrike (<i>Campephaga quiscalina</i>) En fugl sås i Kakamega-skoven og yderligere en sås ved Castle Forest, Mt. Kenya	Purpurstrubet Larvæder
Magpie Shrike <i>Urolestes melanoleucus</i> En håndfuld sås i Masai Mara	Broget Tornskade
Northern White-crowned Shrike (<i>Eurocephalus rueppelli</i>) Almindelig i tør savanne. Set på syv af rejsens dage.	Hvidgumpet Tornskade
Mackinnon's Fiscal <i>Lanius mackinnoni</i> Fire fugle sås i Kakamega.	Sortvinget Tornskade
Grey-backed Fiscal (<i>Lanius excubitoroides</i>) Almindelig. Set på ni af rejsens dage.	Grårygget Tornskade
Common Fiscal (<i>Lanius collaris</i>) Almindelig. Set på 11 på af rejsens dage. Mangler i det tørre nordlige og østlige Kenya.	Sortrygget Tornskade
Long-tailed Fiscal (<i>Lanius cabanisi</i>) Set i Nairobi National Park	Kenyatornskade
Taita Fiscal (<i>Lanius dorsalis</i>) Almindelig i Samburu, hvor den erstatter Common Fiscal.	Taitatornskade
African Golden Oriole (<i>Oriolus auratus</i>) Set i Kakamega ved Rondo Retreat	Sortmasket Pirol
Black-headed Oriole (<i>Oriolus larvatus</i>) Almindelig. Set på syv af rejsens dage.	Østafrikansk Hættepirol
Montane Oriole (<i>Oriolus percivali</i>) Set ved Castle Forest.	Bjergpirol
Western Oriole (<i>Oriolus brachyrhynchus</i>) Hørt i Kakamega-skoven	Olivenrygget Hættepirol
Fork-tailed Drongo (<i>Dicrurus adsimilis</i>) Almindelig. Set på 13 af rejsens dage. Sås ikke i Kakamega	Gaffelhalet Drongo
Sharpe's Drongo (<i>Dicrurus ludwigii</i>) Almindelig i Kakamega. Hed førhen Square-tailed Drongo.	Ligethalet Drongo
African Paradise-Flycatcher (<i>Terpsiphone viridis</i>) Almindelig i skov og frodigt krat. Set på 10 af rejsens dage.	Afrikansk Paradismonark



Grey-Cuckoo Shrike. Foto: Ingelise Petersen

Cape Crow (*Corvus capensis*)
Almindelig - især i højlandet. Set på ti rejsens dage.

Afrikansk Råge

Pied Crow (*Corvus albus*)
Almindelig. Set på 11 af rejsens dage. Ses især i byer og i kulturlandskabet.

Broget Krage



Red-capped Lark, Masai Mara. Foto: Søren Skov

Fan-tailed Raven (*Corvus rhipidurus*)

Korthalet Ravn

Sås syd for Baringo og i Samburu-området.

African Blue Flycatcher (*Elminia longicauda*)

Blå Elminia

Almindelig i Kakamega

White-bellied Tit (*Parus albiventris*)

Hvidbuget Sodmejsje

Ret almindelig. Set på fire af rejsens dage.

Mouse-colored Penduline-Tit (*Anthoscopus musculus*)

Lysbuget Pungmejsje

Set ved Baringo samt i Samburu. Afrikas mindste fugl.

Fischer's Sparrow-Lark (*Eremopterix leucopareia*)

Savannelærke

Almindelig i tørre savanner. Set på tre af rejsens dage.

Pink-breasted Lark (*Calendulauda poecilosterna*)

Rosabrystet Busklærke

Almindelig i Samburu.

Foxy Lark (*Calendulauda alopex*)

Ethiopisk Busklærke

Ret almindelig i det centrale Kenya. Vi så den på to af rejsens dage. Blev førhen regnet som en race af den sydafrikanske Fawn-coloured Lark.

Rufous-naped Lark (<i>Mirafra africana</i>) Almindelig. Set på seks af rejsens dage.	Rødnakket Busklærke
Red-capped Lark (<i>Calandrella cinerea</i>) I Masai Mara sås mindst fire fugle. Regnes af nogle eksperter som en race af Korttået Lærke.	Rødisset Lærke
Slender-billed Greenbul (<i>Stelgidilias gracilirostris</i>) Set i skoven ved Castle Forest.	Tyndnæbbet Bulbul
Red-tailed Bristlebill (<i>Bleda syndactylus</i>) Set i Kakamega.	Børstenæb
Yellow-throated Leaflove (<i>Atimastilas flavicollis</i>) Almindelig i Kakamega.	Gulstrubet Grønbulbul
Joyful Greenbul (<i>Chlorocichla laetissima</i>) Almindelig i Kakamega.	Sangbulbul
Kakamega Greenbul (<i>Arizeloicichla kakamegae</i>) Set i Kakamega. Blev førhen regnet som en race af Shelleys Greenbul.	Kakamegabulbul
Olive-breasted Greenbul (<i>Arizeloicichla kikuyensis</i>) Set i Castle Forest, Mount Kenya	Kikuyobulbul
Little Greenbul (<i>Eurillas virens</i>) Set i Kakamega.	Lille Grønbulbul
Yellow-whiskered Greenbul (<i>Eurillas latirostris</i>) Almindelig i Kakamega. Desuden sås enkelte i bjergregnskoven på Mt. Kenya ved Castle Forest.	Gulskægget Bulbul
Plain Greenbul (<i>Eurillas curvirostris</i>) Set i Kakamega	Løvbulbul
Ansorges Greenbul (<i>Eurillas ansorgei</i>) Set i Kakamega.	Pygmæbulbul
Northern Brownbul (<i>Phyllastrephus strepitans</i>) Set i Samburu.	Nordlig Brunbulbul
Cabanis's Greenbul (<i>Phyllastrephus cabanisi</i>) Set i Kakamega	Lysstrubet Bulbul

- Placid Greenbul** (*Phyllastrephus placidiusi*) Lys Bulbul
Set ved Castle Forest. Blev førhen regnet som en race af Cabanis's Greenbull
- Toro Olive Greenbull** (*Phyllastrephus hypochloris*) Kivobulbul
Set i Kakamega
- Dark-capped Bulbul** (*Pycnonotus barbatus*) Berberbulbul
Almindelig i det meste af Kenya. Set på 14 af rejsens dage. I det tørre nordøstlige Kenya afløses den dog af nedenstående søsterart.
- Dodson's Bubul** (*Pycnonotus dodsoni*) Hvidøret Somalibulbul
Almindelig i Samburu, hvor den afløser Dark-capped Bulbul. Blev førhen regnet som en race af Dark-capped Bulbul, men adskiller sig fra denne ved hvid øreplet og hvide halesider.
- Black Sawwing** (*Psalidoprocne pristoptera*) Blå Skovsvale
Almindelig. Set på 12 af rejsens dage. Tilknyttet skov
- White-headed Sawwing** (*Psalidoprocne albiceps*) Hvidhovedet Skovsvale
Set i Kakamega og i galleriskov i Masai Mara.
- Banded Martin** (*Riparia cincta*) Stor Digesvale
Set på tre af rejsens dage.
- Brown-throated Martin** (*Riparia paludicola*) Brunstrubet Digesvale
Set på fire af rejsens dage. Hedder også Plain Martin og African Sand Martin.
- Grey-rumped Swallow** (*Pseudhirundo griseopyga*) Grågumpet Svale
20 fugle sås ved Lake Naivasha
- African Rock Martin** (*Ptyonoprogne fuligula*) Bleg Klippesvale
Almindelig ved høje klipper og bygninger. Set på seks af rejsens dage.
- Wire-tailed Swallow** (*Hirundo smithii*) Trådhaesvale
Almindelig. Ses især ved vådområder. Set på syv af rejsens dage.
- Barn Swallow** (*Hirundo rustica*) Landsvale
Almindelig. Set på ni af rejsens dage.
- Angola Swallow** (*Hirundo angolensis*) Angolasvale
Ret almindelig i det vestlige Kenya. Set på fem af rejsens dage.
- Red-breasted Swallow** (*Hirundo semifufa*) Rødbrystet Svale
To fugle sås i Masai Mara.



Mosque Swallow, Keekorok, Masai Mara. Foto: Søren Skov

Mosque Swallow (*Cecropis senegalensis*)
 Mindst fire fugle sås i Masai Mara.

Savannesvale

Red-rumped Swallow (*Cecropis daurica*)
 Almindelig. Set på otte af rejsens dage.

Rødrygget Svale

Northern Crombec (*Sylvietta bracchadura*)
 En enkelt iagttagelse.

Okker Crombec

Red-faced Crombec (*Sylvietta whytii*)
 Set på tre af rejsens dage.

Rødbuget Crombec

Green Hylia (*Hylia prasina*)
 Set i Kakamega.

Hylia

Willow Warbler (*Phylloscopus trochilus*)
 En enkelt iagttagelse.

Løvsanger

Brown Woodland Warbler (*Phylloscopus umbrovirens*)
 Set i Castle Forest, Mount Kenya

Rødbrun Løvsanger

Uganda Woodland Warbler (<i>Phylloscopus budongoensis</i>) Set i Kakamega	Ugandaløvsanger
Cinnamon Bracken Warbler (<i>Bradypterus cinnamonmeus</i>) Flere hørtes og en enkelt sås flygtigt Aberdares.	Kopjesanger
Hunter's Cisticola (<i>Cisticola hunteri</i>) Almindelig i højlandet omkring Mt. Kenya og Aberdares. Set på fem af rejsens dage.	Kilimanjarocisticola
Chubb's Cisticola (<i>Cisticola chubbii</i>) Almindelig i Kakamega	Højlandscisticola
Rattling Cisticola (<i>Cisticola chiniana</i>) Den mest almindelige Cisticola-art på savannen. Set på syv af rejsens dage.	Akaciecisticola
Winding Cisticola (<i>Cisticola marginatus</i>) Tilknyttet vådområder. En enkelt iagttagelse.	Sortrygget Cisticola
Stout Cisticola (<i>Cisticola robustus</i>) Almindelig i Masai Mara	Stor Cisticola
Aberdare Cisticola (<i>Cisticola aberdare</i>) To fugle set og hørt Aberdares. Endemisk for Kenya	Abedarecisticola
Croaking Cisticola (<i>Cisticola natalensis</i>) To fugle sås i Masai Mara	Buskcisticola
Tiny Cisticola (<i>Cisticola nana</i>) En enkelt fugl sås i Masai Mara	Dværgcisticola
Zitting Cisticola (<i>Cisticola juncidis</i>) Set i Masai Mara	Cistussanger
Pectoral-patch Cisticola (<i>Cisticola brunnescens</i>) Flere fugle sås syngende i Masai Mara. I det lange græs i Masai Mara sås derudover mange ubestemte cisticolaer, der var for langt væk til sikker bestemmelse.	Brun Cisticola
Tawny-flanked Prinia (<i>Prinia subflava</i>) Set på tre af rejsens dage.	Almindelig Prinia
Red-fronted Prinia (<i>Prinia rufifrons</i>) Set ved Baringo og i Samburu. Kaldes også Red-fronted Warbler. Er for nyligt flyttet til Prinia-familien.	Rødmasket Apalis



Grey-backed Camaoptera, Keekorok, Masai Mara. Foto: Søren Skov

- | | |
|---|------------------------|
| Buff-bellied Warbler (<i>Phyllolais pulchella</i>)
Set på af rejsens dage (Lake Naivasha og Lake Baringo) | Akaciesanger |
| Yellow-breasted Apalis (<i>Apalis flavida</i>)
En savannefugl. Set på fire af rejsens dage. | Gulbrystet Apalis |
| Black-throated Apalis (<i>Apalis jacksoni</i>)
Set i Castle Forest, Mt. Kenya. | Sortstrubet Apalis |
| Chestnut-throated Apalis (<i>Apalis porphyrolaema</i>)
Set i Castle Forest, Mount Kenya | Kastaniestrubet Apalis |
| Buff-throated Apalis (<i>Apalis rufugularis</i>)
Set i Kakamega | Brunstrubet Apalis |
| Grey Apalis (<i>Apalis cinerea</i>)
Set i Castle Forest, Mt. Kenya. | Grå Apalis |
| Grey-capped Warbler (<i>Eminia lepida</i>)
Så dagligt i parken ved Keekorok Lodge, Masai Mara. | Papyrusgråsanger |

Grey-backed Camaroptera (<i>Camaroptera brachyura</i>) Set og navnlig hørt på otte af rejsens dage.	Askegråsanger
Olive-green Camaroptea (<i>Camaroptera chloronota</i>) Set i Kakamega	Oliven Gråsanger
Grey-Wren-Warbler (<i>Calamonastes simplex</i>) Set ved Baringo og i Samburu	Gråsanger
Yellow-bellied Eremomela (<i>Eremomela icteropyialis</i>) Set Baringo	Gulbuget Eremomela
Turner's Eremomela (<i>Eremomela turneri</i>) Almindelig Kakamega. Ses typisk højt oppe i trækroneerne.	Rødpandet Eremomela
African Hill Babbler (<i>Sylvia abyssinica</i>) Hørt ved Mt. Kenya	Afrikansk Skovmunk
Kikuyu White-eye (<i>Zosterops kikuyuensis</i>) Set både i Aberdares NP og på Mt. Kenya (Castle Forest). Endemisk for Kenya.	Bredringet Brilléfugl
Northern Yellow White-eye (<i>Zosterops senegalensis</i>) Set ved Naivasha	Gul Brilléfugl
Scaly-breasted Illadopsis (<i>Illadopsis pyrrhoptera</i>) Hørt i Kakamega	Skælbrystet Skovtimalie
Rufous Chatterer (<i>Turdoides rubiginosa</i>) Set på tre af rejsens dage. (Baringo og Samburu).	Rødbrun Larmdrossel
Black-lored Babbler (<i>Turdoides sharpei</i>) Flere flokke sås i Masai Mara.	Victoria-larmdrossel
Arrow-marked Babbler (<i>Turdoides jardineii</i>) Set på to af rejsens dage.	Plettet Larmdrossel
Northern Pied Babbler (<i>Turdoides hypoleuca</i>) Set i Nairobi National Park.	Broget Larmdrossel
Wattled Starling (<i>Creatophora cinerea</i>) Almindelig – især i Masai Mara, hvor tusindtallige flokke sås sammen med de store dyreflokke. Set på 11 af rejsens dage.	Lappestær
Greater Blue-eared Glossy-Starling (<i>Lamprotornis chalybaeus</i>) Ret almindelig. Set på fire af rejsens dage.	Blåøret Glansstær



Arrow-marked Babbler. Foto: Ingelise Petersen

Wattled Starling (*Creatophora cinerea*) Lappestær
 Almindelig – især i Masai Mara, hvor tusindtallige flokke sås sammen med de store dyreflokke. Set på 11 af rejsens dage.

Greater Blue-eared Glossy-Starling (*Lamprotornis chalybaeus*) Blåøret Glansstær
 Ret almindelig. Set på fire af rejsens dage.

Rüppels Starling (*Lamprotornis purpuropterus*) Blågrøn Glansstær
 Almindelig. Set på 10 af rejsens dage.

Golden-breasted Starling (*Lamprotornis regius*) Kongeglansstær
 Set i Samburu.

Superb Starling (*Lamprotornis superbus*) Trefarvet Glansstær
 Meget almindelig. Set på 12 af rejsens dage.

Hildebrandt's Starling (*Lamprotornis hildebrandti*) Masaiglansstær
 Set på fire af rejsens dage.

Fischer's Starling (*Spreo fischeri*) Askestær
 Almindelig i det tørre nordlige og østlige Kenya. Vi så flere småflokke i Samburu.



Bristle-crowned Starling, Baringo. Foto: Søren Skov

Red-winged Starling (*Onychognathus morio*)

Rødvinget Sortstær

Ret almindelig i Kenya, hvor den ses ved klipper og bygninger. Vi måtte dog nøjes med et par fugle ved vores hotel ved Lake Naivasha.

Violet-backed Starling (*Cinnyricinclus leucogaster*)

Amethyst-stær

Set i Masai Mara og ved Naivasha.

Waller's Starling (*Onychognathus walleri*)

Korthalet Stær

Et par mindre flokke sås ved Castle Forest på Mt. Kenya.

Bristle-crowned Starling (*Onychognathus salvadorii*)

Paryksortstær

Set ved Baringo.

Stuhlmann's Starling (*Poeoptera stuhlmanni*)

Bjergstær

Almindelig i Kakamega.

Yellow-billed Oxpecker (*Buphagus africanus*)

Gulnæbbet Oksehakker

Almindelig. Set på syv af rejsens dage.

Red-billed Oxpecker (*Buphagus erythrorhynchus*)

Rødnæbbet Oksehakker

Almindelig. Set på fire af rejsens dage.

- White-tailed Ant Thrush** (*Neocossyphus poensis*) Hvidhalet Fluedrossel
Set i Kakamega
- African Thrush** (*Turdus pelios*) Afrikansk Drossel
Set på to af rejsens dage.
- Abyssinian Thrush** (*Turdus abyssinicus*) Etioperdrossel
Almindelig i højt beliggende skove og haver. Set på seks af rejsens dage med op til 6 fugle om dagen. Blev førhen regnet som en race af den sydafrikanske Olive Thrush.
- White-browed Scrub Robin** (*Cercotrichas leucophrys*) Plettet Trænattergal
Set på fire af rejsens dage.
- White-eyed Slaty-Flycatcher** (*Melaenornis fischeri*) Brillefluesnapper
Almindelig i højlandet og det vestlige Kenya. Set på syv af rejsens dage.
- Northern Black-Flycatcher** (*Melaenornis edolioides*) Sort Fluesnapper
Ses i Kenya kun vest for Rift Valley, hvor Southern Black Flycatcher ikke forekommer. På vores tur blev den set i Masai Mara og i Kakamega-skoven.
Har en anden stemme end Southern Black Flycatcher (som vi ikke så), men er ellers så godt som umulig at skelne fra denne. De to arter er heldigvis geografisk adskilt, idet Southern ses øst for Rift Valley samt i den nordlige del af landet
- African Grey Flycatcher** (*Bradornis microrhynchus*) Askegrå Fluesnapper
En tørlands-art. Set på fem af rejsens dage.
- Silverbird** (*Empidoenis semipartius*) Sølvrygget Fluesnapper
To fugle sås i den østlige del af Masai Mara
- African Dusky Flycatcher** (*Muscicapa adusta*) Mørk Fluesnapper
Almindelig i højlandsskov. Set på fire af rejsens dage.
- Brown-chested Alethe** (*Stiphornis erythrothor*) Brunbrystet Alethe
Set i Kakamega.
- Cape Robin-Chat** (*Cossypha caffra*) Kapdrosselsanger
Set på fire af rejsens dage. Alle observationer var fra det centrale højland.
- Blue-shouldered Robin Chat** (*Cossypha caffra*) Blåskuldret Drosselsanger
En enkelt iagttagelse i Kakamega
- White-browed Robin-Chat** (*Cossypha heuglini*) Drosselsanger
Set på seks af rejsens dage



Moorland Chat, Aberdares National Park. Foto: Søren Skov

- | | |
|--|------------------------|
| Rueppell's Robin-Chat (<i>Cossypha semirufa</i>)
Set i haven ved Wilderbeest Camp, Nairobi samt Castle Forest. | Højlandsdrosselsanger |
| White-starred Robin (<i>Pogonocicla stellata</i>)
Set i Castle Forest | Hvidstjernet Nattergal |
| Equatorial Akalat (<i>Sheppardia aequatorialis</i>)
Set i Kakamega | Bjergakalat |
| Spotted Palm-Thrush (<i>Cichladusa guttata</i>)
Set på tre af rejsens dage. | Spættet Palmedrossel |
| Little Rock-Thrush (<i>Monticola rufocinereus</i>)
En fugl sås fint i skoven ved Nakuru. | Lille Stendrossel |
| African Stonechat (<i>Saxicola torquatus</i>)
Ret almindelig i højlandet. Set på tre af rejsens dage. Blev førhen regnet som en race af Sortstrubet Bynkefugl. | Afrikansk Bynkefugl |
| Moorland Chat (<i>Pinarochroa sordida</i>)
Meget almindelig i de højtliggende dele af Aberdares. | Hedestensmutte |
| Mocking Cliff-Chat (<i>Thamnolaea cinnamomeiventris</i>)
Set ved Baringo | Klippedrossel |



Golden-winged Sunbird. Foto: Ingelise Petersen

Sooty Chat (*Myrmecocichla nigra*)
Almindelig i Masai Mara.

Sort Myrepikker

Northern Anteater-Chat (*Myrmecocichla aethiops*)

Myrepikker Almindelig i Rift Valley - eksempelvis omkring Naivasha og Nakuru. Også set i Masai Mara. Set på fire af rejsens dage.

Northern Wheatear (*Oenanthe oenanthe*)

De første fugle var allerede ankommet til Kenya. Set på fem af rejsens dage.

Stenpikker

Isabelline Wheatear (*Oenanthe isabellina*)
En enkelt fugl sås i Nairobi Nationalpark

Isabellastenpikker

Abyssinian Wheatear (*Oenanthe schalow lugubrisi*)

To fugle sås ved Nakuru. De var af den lokale race **Schalow's Wheatear**. Blev førhen betragtet som en race af Mourning Wheatear (*Oenanthe lugens*) Klippestenpikker

Ethiopisk Stenpikker

Brown-tailed Rock-Trush (*Cercomela scotocerca*)
Set ved Baringo

Brunhalet Stensmutte



Tacazze Sunbird, Castle Forest. Foto: Søren Skov

Eastern Violet-backed Sunbird (*Anthreptes orientalis*) Østafrikansk Solfugl
Almindelig i den tørre nordlige og østlige del af Kenya. Vi så den ved Baringo og i Samburu.

Collared Sunbird (*Hedydipna collaris*) Kravesolfugl
Set på fire af rejsens dage.

Green-headed Sunbird (*Cyanomitra verticalis*) Gråbuget Solfugl
Set i Kakamega og i Castle Forest.

Olive Sunbird (*Cyanomitra olivacea*) Olivensolfugl
Set i både Castle Forest (racen *olivacea*) og i Kakamega (racen *vincenti*). De to racer regnes af nogle eksperter som to arter - **Eastern Olive Sunbird** *Cyanomitra olivacea* og **Western Olive Sunbird** *Cyanomitra cincti*.

Green-throated Sunbird (*Cyanomitra rubescens*) Grønstrubet Solfugl
Set i Kakamega

Scarlet-chested Sunbird (*Chalcomitra senegalensis*) Skalagenbrystet Solfugl
Almindelig i den centrale og vestlige del af Kenya. Set på fem af rejsens dage.



Malachite Sunbird, Aberdares National Park. Foto: Søren Skov

Hunter's Sunbird (*Chalcomitra hunteri*)

Violetgumpet Solfugl

Erstatter Scarlet-chested Sunbird i den tørre nordlige og østlige del af Kenya. Set på fire af rejsens dage (Baringo og Samburu).

Tacazze Sunbird (*Nectarinia tacazze*)

Tacazzesolfugl

Tilknyttet højlandet. Set på to af rejsens dage. (Aberdares og Mt Kenya)

Bronze Sunbird (*Nectarinia kilimensis*)

Bronzesolfugl

Almindelig i Kakamega og i det centrale højlend. Set på fem af rejsens dage.

Malachite Sunbird (*Nectarinia famosa*)

Malakitsolfugl

Tre fugle sås i Aberdares NP

Golden-winged Sunbird (*Drepanorhynchus reichenowi*)

Gyldenvinget Solfugl

Set på tre af rejsens dage

Northern Double-collared Sunbird (*Cinnyris reichenowi*)

Nordlig Halsbåndsolflugl

Set i Kakamega-skoven og Castle Forest, Mt. Kenya.

Eastern Double-collared Sunbird *Cinnyris medioc*

Østlig Halsbåndsolflugl

Set i Aberdares NP og Castle Forest, Mt. Kenya.

Beautiful Sunbird (<i>Cinnyris pulchellus</i>) Set ved Baringo	Langhalet Pragtsolfugl
Marico Sunbird (<i>Cinnyris mariquensis</i>) Set på tre af rejsens dage	Mariquasolfugl
Shinning Sunbird (<i>Cinnyris habeessinus</i>) 1 Baringo	Glanssolfugl
Variable Sunbird (<i>Cinnyris venustus</i>) Set på to af rejsens dage.	Savannesolfugl
Yellow-spotted Bush Petronia (<i>Gymnoris pyrgita</i>) Set på to af rejsens dage.	Pyrgitastenspurv
Chestnut Sparrow (<i>Passer eminibey</i>) To fugle sås ved Baringo.	Kastanjebrun Spurv
Kenya Rufous Sparrow (<i>Passer rufocinctus</i>) Set på fire af rejsens dage.	Kenyaspurv
Northern Gray-headed Sparrow (<i>Passer griseus</i>) Set på to af rejsens dage.	Gråhovedet Spurv
Parrot-billed Sparrow (<i>Passer gongonensis</i>) Almindelig. Set på fire af rejsens dage. Blev førhen betragtet som en race af Grey-headed Sparrow.	Tyknæbbet Spurv
Swahili Sparrow (<i>Passer suahelicus</i>) Set i Masai Mara. Blev førhen betragtet som en race af Grey-headed Sparrow.	Swahilispurv
House Sparrow (<i>Passer domesticus</i>) Almindelig. Set på seks af rejsens dage.	Gråspurv
White-billed Buffalo-Weaver (<i>Bubalornis albirostris</i>) 10 Baringo	Hvidnæbbet Bøffelvæver
Red-billed Buffalo-Weaver (<i>Bubalornis niger</i>) Set i Samburu.	Rødnæbbet Bøffelvæver
White-headed Buffalo-Weaver (<i>Dinemellia dinemelli</i>) Almindelig i Samburu og ved Baringo.	Hvidhovedet Bøffelvæver
White-browed Sparrow-Weaver (<i>Plocepasser mahali</i>) Almindelig - især i det tørre nordlige og østlige Kenya. Set på otte af rejsens dage.	Spurvevæver



Kenya Rufous Sparrow, Nairobi National Park. Foto: Søren Skov

Donaldson-Smith's Sparrow-Weaver (*Plocepasser donaldsoni*) Hvidkindet Spurvevæver
Almindelig i Samburu

Grey-capped Social-Weaver (*Pseudonigrita arnaudi*) Ørkenvæver
Set i Masai Mara

Black-capped Social-Weaver (*Pseudonigrita cabanisi*) Sorthættet Ørkenvæver
Set i Samburu.

Speckle-fronted Weaver (*Sporopipes frontalis*) Skælhovedet Finkevæver
Set ved Narok, i Masai Mara og i Nairobi Nationalpark,

Baglafecht Weaver (*Ploceus baglafecht*) Baglafecht Væver
Almindelig i højlandet. Set syv af rejsens dage.

Little Weaver (*Ploceus luteolus*) Dværgvæver
Set ved Baringo.

Black-billed Weaver (<i>Ploceus melanogaster</i>) Set i Kakamega	Sortbuget Væver
Holub's Golden Weaver (<i>Ploceus xanthop</i>) Set i haven ved Wilderness Camp, Nairobi og ved Castle Forest	Safrangul Væver
Golden Palm Weaver (<i>Ploceus bojeri</i>) Set i Samburu	Palmevæver
Northern Masked Weaver (<i>Ploceus taeniopterus</i>) Set ved Baringo	Nordlig Maskevæver
Lesser Masked Weaver (<i>Ploceus intermedius</i>) Set i Masai Mara og ved Baringo.	Lille Væver
Vitelline Masked Weaver (<i>Ploceus vitellinus</i>) Set ved Baringo.	Blommegul Maskevæver
Speke's Weaver (<i>Ploceus spekei</i>) Almindelig. Set på seks af rejsens dage.	Somalivæver
Village Weaver (<i>Ploceus cucullatus</i>) Set på tre af rejsens dage. Kaldes også for Black-headed Weaver.	Stor Maskevæver
Viellot's Black Weaver (<i>Ploceus nigerrimus</i>) Set i Kakamega.	Sortvæver
Golden-backed Weaver (<i>Ploceus jacksoni</i>) Set ved Baringo.	Gulrygget Væver
Dark-backed Weaver (<i>Ploceus bicolor</i>) Almindelig i Kakamega.	Sortrygget Skovvæver
Brown-capped Weaver (<i>Ploceus insignis</i>) Set i Kakamega og i Castle Forest.	Brunkronet Væver
Red-headed Malimbe (<i>Malimbus rubricollis</i>) Set i Kakamega	Rødnakket Pragtvæver
Cardinal Quela (<i>Quela cardinalis</i>) Set ved Baringo.	Kardinalvæver
Red-billed Quelea (<i>Quelea quelea</i>) Set på tre af rejsens dage.	Blodnæbsvæver



Northern Red Bishop, Baringo. Foto Søren Skov

Yellow-crowned Bishop (*Euplectes afer*)

Fine hanner i pragtdragt sås ved Baringo

Napoleonsvæver

Northern Red Bishop (*Euplectes franciscanus*)

Fine hanner i pragtdragt sås ved Baringo

Sortisset Orangevæver

Yellow Bishop (*Euplectes capensis*)

Fine hanner i pragtdragt sås ved et stop mellem Kakamega og Baringo.

Fløjlsvæver

Fan-tailed Widowbird (*Euplectes axillaris*)

Sås ved et stop mellem Kakamega og Baringo

Rødskuldret Vidafinke

Yellow-mantled Widowbird (*Euplectes macrourus*)

En enkelt han i pragtdragt sås i Masai Mara

Gulrygget Vidafinke

White-winged Widowbird (*Euplectes albonotatus*)

En flok på et halvt hundrede fugle, der ikke var i yngledragt, sås i Nairobi Nationalpark.

Hvidvinget Vidafinke

Grey-headed Silverbill (<i>Spermestes griseicapilla</i>) Set i Nairobi Nationalpark.	Perlehalsamadine
African Silverbill (<i>Euodictes cantans</i>) Set ved Baringo	Afrikansk Søvlhæb
Bronze Mannikin (<i>Spermestes cucullatus</i>) Noget overraskende havde vi blot en enkelt iagttagelse.	Skadefinke
Red-backed Mannikin (<i>Spermestes nigriceps</i>) En flok sås ved Castle Forest på Mt. Kenya. Blev førhen regnet som en race af Black-and-white Mannikin.	Brunrygget Skadefinke
Yellow-bellied Waxbill (<i>Coccyzygia quartinia</i>) Set ved Castle Forest på Mt. Kenya	Grønrygget Astrild
White-breasted Nigrita (<i>Nigrita fusconotus</i>) En enkelt sås i Kakamega	Hvidbrystet Skovastrild
Grey-headed Nigrita (<i>Nigrita canicapillus</i>) Ret almindelig i Castle Forest på Mt. Kenya.	Skovastrild
Black-cheeked Waxbill (<i>Estrilda charmosyna</i>) Set i Samburu.	Alfe-astrild
Kandt's Waxbill (<i>Estrilda kandti</i>) Set i Castle Forest på Mt. Kenya. Blev førhen regnet som en race af den vest-og centralafrikanske Black-headed Waxbill.	Sortkappet Astrild
Common Waxbill (<i>Estrilda astrild</i>) Set på tre af rejsens dage.	Helena-astrild
Crimson-rumped Waxbill (<i>Estrilda rhodopyga</i>) Også denne art sås på tre af rejsens dage.	Tøjleastrild
Cut-throat Finch (<i>Amadina fasciata</i>) Set ved Baringo	Båndfinke
Purple Grenadier (<i>Granatina ianthinogaster</i>) Almindelig. Set på fem af rejsens dage.	Violbuget Granatastrild
Red-cheeked Cordon-bleu (<i>Uraeginthus bengalus</i>) Almindelig. Set på otte af rejsens dage.	Sommerfuglefinke



Purple Granadier, Keekorok, Masai Mara. Foto: Søren Skov

Blue-capped Cordon-bleu (*Uraeginthus cyanocephalus*) Blåhovedet Sommerfuglefinke
Set ved Baringo

Red-billed Firefinch (*Lagonosticta senegala*) Amarant
En enkelt iagttagelse.

Village Indigobird (*Vidua chalybeate*) Atlaskfinke
En enkelt iagttagelse ved stop mellem Kakamega og Baringo

Pin-tailed Whydah (*Vidua macroura*) Dominikanerenke
To iagttagelser af hanner i pragtdragt, som vi alle så samt en flot observation af en han i sangflugt, som godt halvdelen af gruppen så.

Straw-tailed Whydah (*Vidua fischeri*) Stråvidafinke
To iagttagelser fra bil i fart.

Long-tailed Paradise-Whydah (*Vidua paradisea*) Paradisenke
Ved Baringo sås to fine hanner hanner i pragtdragt

Western Yellow Wagtail (*Motacilla flava*) Gul Vipstjert
Set på tre af rejsens dage.

Mountain Wagtail (<i>Motacilla clara</i>) En enkelt fugl sås ved Naro Moro. Samme dag sås to fugle senere ved et vandløb i Castle Forest.	Afrikansk Bjergvipstjert
African Pied Wagtail (<i>Motacilla aguimp</i>) Almindelig. Set på 14 af rejsens dage.	Afrikansk Vipstjert
Golden Pipit (<i>Tmetothylacus tenellus</i>) Sås i Samburu. Desværre var det ikke alle, der fik set denne fine fugl.	Guldpiber
Sharpe's Longclaw (<i>Macronyx sharpei</i>) En fugl sås ved Kinanagop Plateau. Desuden sås en fugl ved et stop nær Nakuru	Kenyasporepiber
Yellow-throated Longclaw (<i>Macronyx croceus</i>) Set på fire af rejsens dage.	Gulbrystet Sporepiber
Pangani Longclaw (<i>Macronyx aurantiigula</i>) Sås i Nairobi Nationalpark.	Panganisporepiber
Rosy-throated Longclaw (<i>Macronyx ameliae</i>) Flere fugle sås meget fint i Masai Mara	Rosasporepiber
African Pipit (<i>Anthus cinnamomeus</i>) Almindelig. Set på fem af rejsens dage med 1-4 fugle om dagen	Savannepiber
Plain-backed Pipit (<i>Anthus leucophrys</i>) Almindelig i Masai Mara.	Afrikansk Storpiber
African Citril (<i>Serinus citrinelloides</i>) Set på to af rejsens dage.	Finnæbbet Sisken
Reichenow's Seedeater (<i>Serinus rechenowi</i>) Set på tre af rejsens dage. Hed førhen Yellow-rumped Seed-eater	Miombosisken
White-bellied Canary (<i>Serinus dorsostrita</i>) Set i Samburu	Hvidbuget Sisken
Yellow-fronted Canary (<i>Serinus mozambicus</i>) Set på fem af rejsens dage	Mozambiquesisken
Brimestone Canary (<i>Serinus sulphurata</i>) Set ved Mount Kenya.	Svovlgul Sisken
Thick-billed Seed-eater (<i>Serinus burtoni</i>) Set ved Mount Kenya	Kernebidersisken



Southern Tree Hyrax, Keekorok, Masai Mara. Foto: Søren Skov.

Streaky Seed-eater (*Serinus striolatus*)

Set på fem af rejsens dage.

Stribet Sisken

Yellow-crowned Canary (*Serinus flavivertex*)

Set i Castle Forest

Gulkronet Sisken

Cinnamon-breasted Rock-bunting *Emberiza tahapisa*

To fugle sås i Nairobi National Park

Afrikansk Klippeværbling

Pattedyr

Systematikken følger the Kenya Mammal Checklist, Nairobi Museum.

Southern Tree Hyrax (*Dendrohyrax arboreus*)

1-2 sås fint i et træ i parken ved Keekorok Lodge i Masai Mara. Derudover blev flere hørt kalde/skrige om aftenen og natten ved både Naro Moro og Castle Forest, Mt. Kenya.

Trægrævling



Syke`s Monkey. Foto: Ingelise Petersen

Rock Hyrax (*Procavia capensis*)

Klippegævling

Set på fire af rejsens dage ved Baringo og Samburu. Er udbredt i store dele af Afrika og Mellemøsten og opdeles af nogle eksperter i op til fem forskellige arter.

African Bush Elephant (*Loxodonta africana*)

Afrikansk Savanneelefant

Almindelig. Set på syv af rejsens dage. Det højeste antal var 100 Samburu

Black and White Colobus (*Colobus guereza*)

Sort-hvid Colobus abe

Almindelig i skovene i både det centrale højland og i Kakemega-regnskoven i det vestlige Kenya. I Aberdares og ved Mt Kenya sås racen **Mt. Kenya Guereza**, *Colobus g. kikuyuensis*, mens vi i Kakamega så racen **Mau Forest Guereza**, *Colobus g.matschiei*

Olive Baboon (*Papio anubis*)

Anubisbavian

Almindelig i størstedelen af Kenya, men mangler i det sydøstlige hjørne, hvor den afløses af Yellow Baboon. Vi så arten på 13 af rejsens dage med op til 150 dyr om dagen.

Vervet Monkey (*Cercopithecus aethiops*)

Grøn Marekat

Almindelig. Set på 11 af rejsens dage med op til 50 dyr om dagen. Arten er vidt udbredt i Afrika og opdeles i flere racer. Vi så den i Kenya almindelige race *hilgerti*



Løver i parring, Masai Mara. I de dage, hvor hun-løven er i brunst, parrer han-løven sig med hende med 15-20 minutters mellemrum døgnet rundt. En imponerende vitalitet. Foto: Søren Skov

Gentle Monkey *Cercopithecus mitis*)

I Kakamega-regnskoven var racen **Stuhlmans Blue Monkey** *Cercopithecus mitis stuhlmani* almindelig. Ved Castle Forest og Nairobi National park så vi racen **Kolb's Monkey**, også kaldet **Syke's Monkey**, *Cercopithecus mitis kolbi*

Red-tailed Monkey (*Cerocebus ascanius*)

I Kakamega var den ret almindelig. Den aktuelle race er *schmidti*

Red-legged Sun Squirrel (*Heliosciurus rofobrachium*)

Set i Kakamega på to af rejsens dage.

Striped Ground Squirrel *Euxerus erythropus*

En enkelt iagttagelse

Unstriped Ground Squirrel *Xerus rutilus*

Så i Samburu, Shaba og Baringo. Set på fire af rejsens dage.



Gepard, Masai Mara. Foto: Søren Skov

Copyo *Myocastor coypus*

Sumpbæver/Bæverrotte/Nutria

Sås i Naivasha søen. En indført og invasiv art, der oprindeligt kommer fra Sydamerika.

African Savanna Hare *Lepus victoriae*

To sås i Samburu

Wahlberg's Epuleted Fruit Bat *Epomophorus wahlbergi*

Flere sås hængende i loftet ved indgangsportalen til Nairobi National Park.

Black-backed Jackal (*Canis mesomelas*)

Skaberaksjakal

Set på tre af rejsens dage. I Nairobi Nationalpark sås den med hvalpe.

Lion (*Panthera leo*)

Løve

11 Masai Mara, 6 Samburu og en i Nairobi Nationalpark

Leopard (*Panthera pardus*)

Leopard

To i i Masai Mara. Desuden sås i Samburu 1 hun med en killing, som vi så to dage i træk.

Cheetah (*Acinonyx jubatus*)

Gepard

To brødre sås fint i Masai Mara.



Leopard med killing, Samburu. Foto: Søren Skov

Wild Cat *Felix ailvestris*

Afrikansk Vildkat

En enkelt sås meget fint i Masai Mara. Er ret almindelig i beskyttede naturområder i Kenya, men ses sjældent. Er kendt som den vilde stamfader til vores huskat.

Spotted Hyena (*Crocuta crocuta*)

Plettet Hyæne

Almindelig i Masai Mara, hvor vi så omkring 25 dyr.

Slender Mongoose (*Herpestes sanguineus*)

1 løb over vejen foran den ene bil.

Banded Mongoose (*Mungus mungo*)

Zeboramangust

Mindst 50 Masai Mara

Dwarf Mongoose (*Helogale pervula*)

Dværgmangust

En halv snes dyr i Masai Mara samt enkelte i Samburu

Plains Zebra (*Equus burchelli*)

Almindelig Zebra

Almindelig. Det højeste antal sås i Masai Mara, hvor vi så op mod 200.000 dyr. Sås også flere steder udenfor nationalparkerne. Kaldes også for Common Zebra.



Hvide Næsehorn, i baggrunden kongonier. Nairobi National Park. Foto: Søren Skov

Grevy's Zebra (*Equus grevyi*)
150 Samburu

Grevys Zebra

White Rhinoceros (*Ceratotherium simum*)

Hvidt Næsehorn

8 Nakuru, 7 Nairobi National Park. Den oprindelige bestand af den nordlige underart er uddød. Den nuværende bestand udgøres af udsatte dyr fra Sydafrika og er derfor af den sydlige race.

Black Rhinoceros *Diceros bicornis*

Sort næsehorn

1 Nakuru – en gammel udstødt han, der så døende ud, men efter sigende ikke var det. Desuden sås 4 Nairobi Nationalpark. Det går godt med næsehorn-bestanden i Kenya, da man i Kenya er gode til at passe på dem, da hvert eneste næsehorn overvåges. Der er afsat en ranger pr. næsehorn til at beskytte bestanden.

Giraffe (*Giraffa camelopardalis*)

Giraf

Almindelig. Er opdelt i flere racer. I størstedelen af Kenya sås Masaigiraffen *tippelskirchi*, men i Samburu sås den smukke Netgiraf, *reticulata*, og ved Nakuru Rothschild's Giraf, *rothchildi*.



Plettet Hyæne, Masai Mara. Foto: Søren Skov

Desert Warthog (*Phacocherus aethiopicus*)

Ørken-vortesvin

Almindelig i Samburu.

Warthog (*Phacocherus africanus*)

Vortesvin

Almindelig i Masai Mara. Også set i Nairobi Nationalpark.

Hippopotamus (*Hippopotamus amphibius*)

Flodhest

Almindelig ved søer og floder i naturbeskyttede områder. Det højeste antal var ca. 100 Masai Mara.

African Buffalo (*Syncerus caffer*)

Kafferbøffel

Almindelig i de store nationalparker Masai Mara og Samburu. Blev også set i Nairobi Nationalpark.

Greater Kudu *Tragelaphus strepsiceros*

Stor Kudu

Tre sås i Samburu. Er ret sjælden i Kenya

Bushbuck (*Traelaphus scriptus*)

Skriftantilope

1 i parken ved Keekorok Lodge, Masai Mara og 5 Nairobi Nationalpark

Eland (*Traelaphus oryx*)

Elsdyrantilope

150 Masai Mara. Desuden set i Nakuru og 20 Nairobi Nationalpark.

Suni *Nesotragus moschatus*

1 Nairobi Nationalpark

Harvey's Duiker *Cephalophus harveyi*

3 Aberdares

Weyn's Duiker *Cephalophus weyni*

1 Nairobi Nationalpark

Kirk's Dik-Dik (*Madoqua kirki*)

En sås i Masai Mara. Desuden sås flere i Samburu

Kirk's Dik-Dikantilope

Guenther's Dik-Dik (*Madoqua guentherii*)

To til tre dyr blev med sikkerhed bestemt til denne art i Samburu ved hjælp af deres store næser – en ordentlig gynter.

Guenther's Dik-Dikantilope

Thomson's Gazelle (*Gazella thomsonii*)

Meget almindelig - især i Masai Mara, hvor der sås tusindvis af dyr.

Thomsons Gazelle

Grant's Gazelle (*Gazella granti*)

Er ligeledes ganske almindelig, men sås i betydeligt færre antal i forhold til Thomson's Gazelle. I Masai Mara og Nairobi Nationalpark sås racen *granti*, mens vi i Samburu så racen *notata*.

Grants Gazelle

Gerenuk (*Litocranius walleri*)

Knap et halvt hundrede sås i alt i Samburu-Shaba-området.

Girafantilope

Bohor Reedbuck (*Redunca redunca*)

1 Masai Mara, 1 Nairobi Nationalpark.

Bohor Rørbuk

Waterbuck (*Kobus ellipsiprymnus*)

Almindelig. Vi så både racen Common Waterbuck *K. e. ellipsiprymnus* og racen Defassa Waterbuck *K. e. defassa*.

Vandbuk

Impala (*Aepyceros melampus*)

Almindelig. Set på 11 af rejsens dage med op til 500 dyr om dagen. Sås flere steder udenfor nationalparkerne.

Impala

Topi (*Damaliscus korrigum*)

Mindst 5000 Masai Mara. Deltager ikke i det store træk i Masai Mara-Serengeti, men opholder sig året rundt i nogenlunde de samme områder.

Topi-antilope

Hartebeest (Kongoni) (*Alcelaphus buselaphus*)

Set på fem af rejsens dage, idet vi alt så omkring 100 Masai Mara og mindst 50 Nairobi Nationalpark. Alle dyr var af racen **Coke's Hartebeest** *coki*

Koantilope



Nilkrokodille, Samburu. Foto: Søren Skov

Blue Wildebeest (White-bearded Gnu) *Connochaetes taurinus* Gnu
I Masai Mara sås op mod en halv million dyr. Her var dyrene af den mørke race *mearnsi*.
Desuden sås den i tre-og to cifrede antal i Nairobi Nationalpark og ved Naivasha – her var
der tale om den lysere race *albojubatus*.

Beisa Oryx (*Oryx beisai beisai*) Oryxantilope
Almindelig i Samburu

Blandt andre dyr kan nævnes:

Nilkrokodille
Sås i bl.a. Masai Mara, Samburu og i Lake Baringo.

Leopardskildpadde
1 Baringo