

NEPAL

November 2019



Sarustrane – højde ca. 1½ m.

(foto Inger Filipsen)

DOF Travel
Dansk Ornitologisk Forening
Birdlife Denmark

Ole Brauer
Februar 2020

Indledning

Dette var den første DOF-traveltur til Nepal i mange år. Ganske afgørende for turens planlægning og gennemførelse var formanden for Bird Conservation Nepal (BCN, Nepals BirdLife-medlemsorganisation), Rajendra Gurung, der som professionel guide havde stået for den vellykkede organisering af alle turens detaljer, og som personligt var vores meget dygtige fugleguide på hele turen. Rejsegruppen bestod i øvrigt af 12 deltagere foruden undertegnede som turleder.

”Nepal” får nok de fleste til at tænke på Himalaya og enorme hvide bjerge. Vi fik da også nogle få kig på den slags kæmper undervejs – især godt anden dag – men fra Kathmandus behagelige ca. 1400 m.o.h. kom vi næppe meget højere end ca. 2500 m., og kæmpebjergene har det med at sløre sig i dis. Vores rejse gik mere nedad mod lavlandsområderne nær Indien, som ligger i omegnen af 100 – 400 m.o.h. Det var absolut med forsæt at turen var lagt kort efter regntidens afslutning, men inden varmen rigtigt havde sat ind!

Det følgende er et forsøg på at skildre turen både kort og med relevante detaljer. De steder vi besøgte, gennemgås med omtale af de mest markante og/eller typiske sete arter, og der er som bilag en fuldstændig artsliste for turen på 321 sete arter. Listen er baseret på en daglig gennemgang og afkrydsning *in pleno* af hvad der var set i dagens løb, på et til formålet fremstillet skema med alle Nepals 886 registrerede fuglearter.

Selve rapportteksten postulerer ikke at være udtømmende for alt hvad der skete eller blev set, men beror i høj grad på undertegnede subjektive udvælgelse af hvad der var interessant og kan tænkes at interessere andre. Gennemgangen af besøgte steder er næppe mere end 90 % udtømmende – mere kontrol er det ikke muligt for en turleder at have over hvor deltagerne tager kikkerten frem og ser noget!

Første dag (Søndag 17. november) – 48 arter – Kathmandu

Turen startede med et par dages akklimatisering i og omkring Kathmandu efter ankomsten sen eftermiddag 16. november (så sen at det kun blev til få, temmelig banale fugleobservationer fra bussen fra lufthavnen). Før morgenmaden næste morgen gik det til gengæld løs med en del fuglekigning omkring vores hotel i udkanten af Kathmandu – **Gokarna Forest Resort** – som med en del træer og anden bevoksning var specielt udvalgt til formålet og var meget produktiv. F.eks. blev vi hurtigt præsenteret for *Greater Yellownape*, som er en flot grøn spætte med gul nakkekam, samt adskillige barbet-arter bl.a. *Bluethroated Barbet*, og mange andre lokalt almindelige arter. Det var også her vi så *Ashy Wood Pigeon* og *Fire-breasted Flowerpecker* for første gang; de kom hver for sig kun en gang mere.

Op ad formiddagen besøgte vi den meget spændende **Ranabari Community Forest** midt i et særdeles bymæssigt område i Kathmandus centrale del. Her har kvarterets beboere på tværs af byens udvikling hæget om en lille oprindelig skov der nærmest har karakter af en vild park med anlagte stier – og masser af store og små træer og tilhørende fugle. BCN har et (meget lille) kursuscenter i skoven, som anvendes til undervisning af skoleklasser o.l. Her var den mest populære observation nok en lille familie af *Spotted Owlet*, der kiggede lige så meget på os som vi på dem. Vi så også den kun 10 cm store mini-spætte, *Speckled Piculet*.

Under et kort besøg på **BCN's kontor** midt i Kathmandu præsenterede personalet forskellige aspekter af organisationens arbejde, ikke mindst arbejdet gennem de seneste ca. 10 år med at vende udviklingen for de

forskellige gribbearter fra styrtedyk p.g.a. forgiftning til tydelig fremgang. Det fik vi senere lejlighed til at se tæt på i felten. BCN forsøger også mere generelt at interessere især skolebørn for fugle og natur.



Blue-throated Barbet

Greater Yellownape

(begge fotos Erik Heberg)

Resten af dagen var vi lidt mere almindelige turister og besøgte imponerende templer og udsigter over Kathmandu, som også gav lejlighed til at øve sig på de almindelige lokale fuglearter. Ved templet på Monkey Mountain, Swoyambhu, så vi mange *Black-eared Kite* flyve rundt meget tæt på. Sent på eftermiddagen besøgte vi også den imponerende Great Boudha Stupa.

Anden dag (mandag 18.november) – 68 arter – Phulchowki

Den første længere udflugt gik til Phulchowki/Godawari bjerget, som ligger en snes kilometer syd for Kathmandus centrum. Vi kørte op, og kunne så gå nogenlunde mageligt ned. Før det rigtigt begyndte at gå opad gjorde vi dog et stop ved et mindre vandløb, og minsandten om det ikke blev vores første møde med *Spotted Forktail*, som vi også fik set et par gange mere samme dag og i de følgende dage, men som er ret sky og derfor ikke så almindelig at se godt – men det gjorde de fleste af os her. Fire *Khalij Pheasant* blev det også til på vejen op.

Da vi nærmede os toppen (det sidste stykke til fods), viste der sig en fantastisk udsigt mod nord! For en gangs skyld var himlen helt klar, og bag de mindre bjerge vi ellers havde set på, viste hele striben af Annapurna-kædens hvide toppe sig som en lang, solbeskinnet, kæmpemæssig tandrække i flere dimensioner. Nogle af os kom faktisk lidt fra det der med at se efter fugle på det tidspunkt... Helt oppe på toppen lod de venlige soldater som var stationeret der af en grund vi ikke spurgte til, os komme ind på deres område hvorfra man havde det bedste blik mod de hvide bjerge. Bortset fra bjergene gav det bl.a. *Mountain Hawk Eagle*, *Booted Eagle*, og *Himalayan Buzzard*. Det var også her vi faldt over den første af hele turens to lærkearter, nemlig et eksemplar af *Oriental Skylark*.

Nedturen foregik i store træk til fods i noget spredte grupper gennem moden skov med observation af mange forskellige arter spredt på forskellige deltagere. F.eks. sås rejsens første *White-throated Kingfisher*, som med kun en enkelt undtagelse blev daglig for hele resten af turen. Det blev også til ikke mindre end

seks forskellige arter af *Laughingthrush*: *White-throated*, *White-crested*, *Striated*, *Grey-sided*, *Streaked* samt *Chestnut-crowned Laughingthrush*! Ved et lille vandhul med tæt bevoksning fik vi set mange spændende arter der for en hektisk stund var nede for at drikke og for at vaske sig, arter som f.eks. *White-collared Blackbird*, *Rufous-winged*- og *White-browed Fulvetta* samt *Bar-throated Siva*. I den tættere skov så vi en smuk han af *Blue-Fronted Redstart*.

Tredje dag (tirsdag 19. november) – 66 arter – Shivapuri

Denne dag gik turen op i de skovbevoksede bakker/bjerge nord for Kathmandu, som udgør Shivapuri National Park, og som også giver nogle flotte udsigter. Det var stort set vandring i skov, både op og ned, men vi indtog – med noget besvær p. gr. a. de mange hurtige og årvågne Rhesus-aber – den medbragte frokost på græsplænen ved et buddhistisk nonnekloster med flot udsigt over Kathmandu-dalen og de omkringliggende mellemhøje bjerge – og mange fugle. Her fik vi også turens første gribbeart (af i alt seks), meget passende var det *Himalayan Vulture*.

Ellers bragte dagen naturligt nok især skovfuglearter. Vi var mange der begejstrede for at se i alt tre eksemplarer af den smukke Long-tailed Broadbill samt et par af *Khalij Pheasant*. Blandt de øvrige mere spektakulære arter kan i flæng nævnes: *Yellow-bellied* såvel som *White-throated Fantail*; *Long-tailed Shrike*; *Spangled Drongo*; ikke mindre end tre arter af rødstjert, hhv. *Blue-Fronted*, *White-Capped* og *Plumbeous Water Redstart*; endnu en *Spotted Forktail*; *Dark/Black-throated Thrush*; og både han og hun af *Orangebellied Leafbird*. I et blomstrende træ var der 15-20 *Fire-tailed Sunbird* der sugede nektar; hannerne mangler den lange hale på denne årstid, men brandrøde haler havde de dog. Vi fik også set tre *Red-billed Blue Magpie*.

Fjerde dag (onsdag 20. november) – 65 arter – vejen til Pokhara

I en mindre bus – med god plads til os 14 plus chaufføren og hans unge hjælper (kaldet Minivet p.g.a. hans røde T-shirt) samt vores bagage på taget – forlod vi Kathmandu ad Nepals suverænt tættest trafikerede vej, hovedvejen mod Indien. Det var en spektakulær køretur, hovedsageligt langs – tit højt over! – en stor flod der snor sig gennem bjergene i en dyb dal. Spontane stop var ikke mulige p.g.a. trafikken, men vi gjorde holdt ved forskellige afkørselsmuligheder adskillige gange undervejs, hvad der gav gode muligheder for både at se efter fugle ved floden og at se nærmere på folkelivet. Størst indtryk i den sidste afdeling gjorde formentlig en åben kremering der et sted var i gang på den anden side af floden, med stort opbud af sørgende og andre gæster.

M.h.t. fugle fik vi en række ænder i bogen som vi også kender hjemmefra, f.eks. rustand (*Ruddy Shelduck*), knarand (*Gadwall*) og såmænd turens eneste gråand (*Mallard*), men også en mere eksotisk art som *Barheaded Goose* lod sig se. Turens første, men bestemt ikke sidste steppeørn (*Steppe Eagle*) skal også nævnes.

Ved middagstid kørte vi over floden (på en fin bro) og fulgte derfra en anden floddal mod Pokhara. På vejen lykkedes det også lige at gøre et spontant stop ved nogle rastetræer for gribbe – fem arter blev det til: *Egyptian*, *White-rumped*, *Slender-billed*, *Himalayan* samt *Red-Headed Vulture*. Alt i alt tog køreturen til Pokhara 7-8 timer.

Pokhara er en populær turistby, men udmærker sig derudover ved at ligge ved en stor sø med mange fugle. Vi nåede lige en tur i den nydelige lille park der ligger hvor søen løber ud i en mindre flod. Her sås bl.a.

Citrine og *White-browed Wagtail* såvel som både *Scaly-breasted* og *Chestnut Munia* for første gang på turen. Om aftenen var der musik og dans på hotellets underholdningsscene, dog ikke for vores skyld, men til ære for nogle højtstående militærfolk. Senere på aftenen/natten kunne kaldet "Toot-too" fra en *Mountain Scops Owl* høres fra bjergskråningerne.

Femte dag (torsdag 21. november) – 101 arter – Pokharas omegn

Dagens første stop var i en mindre by i Pokharas omegn hvor igennem der løber en flod med et par styrt, og hvor der er en bro man kan stå på, samt en sluse. Her så vi turens tredje og sidste *Spotted Forktail*,



Spotted Forktail (foto Chr. Glahder)



Little Forktail (foto Chr. Glahder)

men endnu mere interessant viste der sig her også det første og eneste eksemplar af den plettedes lillebror, *Little Forktail*. Den er vitterligt meget lille, men deler storebrorens vane med at fouragere fra sten til sten i strømmende vandløb. Vi blev hængende samme sted temmelig længe, for pludselig dukkede der også en *Wallcreeper* (murløber) op! Den sad længe højest 15 – 20 meter fra os i en sprække i slusens lodrette beton, hvorfra den gjorde jævnlige udfald mod insekter over vandet. Meget spændende observation! Her så vi også den store isfugl *Crested Kingfisher*.



Wall-creeper (foto Lis Kastrup)



Også *Wall-creeper* – kan I finde mig? (foto Mar. Johnson)

Vi gjorde også stop ved forskellige mindre lokaliteter og "krat", hvor vi dog ikke havde det store held med os. Observationer der er særligt værd at fremhæve fra denne del af formiddagen, er hhv. *Lesser RacketTailed Drongo* samt de bittesmå *Chestnut-headed* og *Grey-bellied Tesia* som vi hørte, men desværre ikke fik set, selv om vi så bevægelser i vegetationen.

Det meste af eftermiddagen tilbragte vi med at se på vade- og andre vandtilknyttede fugle på Pokharasøens nordside. Her ligger der lige ud til søen et større, delvis græsbevokset område som på denne årstid var tørt, men med en del huller med mere eller mindre vand i. Her fik vi bl.a. turens første *Black Stork* og den eneste *Pallas's Fish Eagle*; sidstnævnte rastede i et træ på modsatte side af søen og var venlig nok til også at flyve lidt frem og tilbage. Der var også flere isfuglearter (*Common*, *White-Throated* og *Crested Kingfisher*), såvel som velkendte og mindre velkendte vadefugle, f.eks. mudderklire (*Common Sandpiper*) og *Greyheaded Lapwing*.

Sjette dag (fredag 22. november) – 70 arter – vejen til Chitwan

Denne dag startede med lidt kratlusk i skoven langs asfaltvejen til hotellet, som bl.a. kastede en *Smoky Warbler* af sig. Det er en lille *phylloscopus* der ikke gør meget væsen af sig.

Ellers var det en køredag fra Pokhara til Chitwan Nationalpark, 5-6 timers kørsel, igen hovedsageligt ned ad bakke og ned i varmen. På vejen gjorde vi holdt i et landbrugsområde (Hasten Rice Fields) lidt uden for Pokhara med rismarker, høstakke og småsøer. Her tilbragte vi et par timer hvor vi fik lov at traske stille rundt i kanten af de nyhøstede marker.

Af særlig interesse var her mindre flokke af den yderst sjældne, overvintrende *Yellow-breasted Bunting*, hvoraf vi fik set ca. 15 fugle ude i rørene i rismarkerne. Længere ude i de høstede rismarker fik vi med lidt tålmodighed også set endnu en *Smoky Warbler* der smuttede rundt i rørene. Herude blev det også til en *Blue-bearded Bee-eater*.

Dagen gav også et første møde med både *Asian Pied Starling*, som er almindelig i de lavereliggende dele af Nepal og blev en daglig foreteelse på resten af turen indtil Kathmandu; og med *Indian Peafowl* – på dansk kendt slet og ret som "påfugl", men her i vild form.

Syvende dag (lørdag 23. november) – 124 arter – Chitwan National Park

Nationalparken rummer et rigt fugle- og dyreliv, og publikum slippes ikke (mere) løs uden ledsagelse af en eller flere rangers. Om det mest er for at servicere og beskytte publikum eller for at beskytte dyrene, kan man fundere over som man vil. Vi oplevede det i hvert fald som en stor fordel at have lokalkendte folk med. Fra morgenstunden kom vi på en stille sejltur langs en større flod, hvor vi fra kanoen kunne iagttage livet ved og på bredden ganske tæt på. Det blev bl.a. til turens eneste *Grey-headed Fish Eagle*, men de fleste fugle lige i vandkanten var vadefugle vi kendte hjemmefra: *Sortklire*, *Hvidklire*, *Rødben*, *Mudderklire* og *Temmincksryle*.

Det var også på denne tur at vi stiftede det første bekendtskab med de to lokale krokodillearter som lå i smågrupper og solede sig på bredden: Den meget lidt hyggeligt udseende *Mugger Crocodile*, der er både stor og grim, og *Gharial Crocodile*, der heller ikke er køn, men ser ud som var den tegnet af Walt Disney – og som efter sigende alene lever af fisk. Kanoen holdt en ærbødig afstand fra begge arter, og de forholdt sig roligt. Den maraboustork-lignende *Lesser Adjutant* holdt gerne til i nærheden af disse store krybdyr.

Om eftermiddagen kørte vi afsted i to særligt indrettede jeeps med panoramaudsigt fra passagerpladserne, fra rangernes side primært for at finde *Tiger* og *Greater One-horned Rhinoceros* (indisk næsehorn). M.h.t. næsehorn lykkedes også at se en hun med unge samt en gammel han på ganske tæt hold, men ingen tiger. Undervejs var der til gengæld mange fugle, heraf en række som vi for første gang så her. Det gjaldt f.eks. den første af i alt kun tre *White-rumped Spinetail*, som er Nepals eneste sejlertype af den slægt. Turens eneste overvintrende Vendehals (*Wryneck*) er også værd at bemærke, tillige med den anden og sidste observation af en lærkeart, nemlig *Bengal Bush Lark* (også kaldet *Rufous-winged Lark*). En *Common Chiffchaff* (gransanger) havde også fundet vej ned til varmen.

Vi fik turens første ibisart her, nemlig *Red-naped Ibis*. Værd at nævne er endvidere den lillebitte falk *Collared Falconet* (betydeligt mindre end en solsort), der kun blev set denne dag, samt *Crested Treeswift*, som kun blev set denne dag og igen to dage senere.

De daglige observationer af de iøjne- og iørefaldende bulbul'er skiftede art her. *Himalayan Bulbul* afløstes nu med en enkelt undtagelse af *Red-whiskered Bulbul* lige indtil vi var tilbage i Kathmandu, ligesom *Redvented Bulbul*, som vi hidtil kun havde set et par gange, nu blev dagligt forekommende. *Jungle Babbler* dukkede op her og var siden stort set daglig.

Ottende dag (søndag 24. november) – 84 arter – Chitwan til Lumbini

Denne dag gik turen videre mod vest i lavlandet, hvor hovedmålet var Bird Conservation Nepal's gribbefodringsstation nær Pithauli. Gribbene gik voldsomt tilbage i midten af 1990'erne, og først omkring 2010 lykkedes det at vende denne udvikling. Baggrunden var landbrugets brug af det smertestillende middel *diclofenac* på syge køer. Når køerne døde og blev ædt af gribbe, fik disse midlet ind i kroppen hvilket er dødeligt for dem. Da denne sammenhæng blev kendt, blev *diclofenac* forbudt og erstattet af et mindre skadeligt middel. Desuden blev der oprettet såkaldte gribberestauranter hvor køer uden medicinrester serveres for gribbene. Endelig er der startet yngleprogrammer i fangenskab, især for *White-rumped Vulture*. Med disse midler er det i de senere år lykkedes at vende den nedadgående bestandskurve for i hvert fald nogle af gribbearterne.

Ud over en fodtur rundt i området med tilhørende blandet fuglekigning (og med spor af både tiger og næsehorn) var vi dagens æresgæster på de permanent indrettede bænkerader i skjuleet ved fodringsstedet. Gribbene vidste tydeligvis hvad der var i vente og samlede sig i store tal i træerne omkring pladsen. Da alle var klar, blev en til formålet slagtet ko læsset af en ladvogn på fodringsstedet, og i løbet af et øjeblik var en bunke på godt 100 gribbe i gang med at fortære kadaveret. Og ordet "bunke" skal tages helt bogstaveligt, for gribbene kravlede bogstaveligt talt rundt på hinanden, og de største og stærkeste arter kom først til de bedste godbidder. Vi skønnede at omkring fyrrer gribbe var i gang på en gang da det gik hårdest for sig. Men efterhånden som nogle af de største havde fået nok og trak sig tilbage til træerne omkring pladsen, blev der bedre plads til dem der rangerede lavere i hakkeordenen. Og efter en times tid var der kun de nøgne skeletdele tilbage af den stakkels ko der havde lagt krop til festen.



Deltagende gribbearter i fodringen nævnt i "hakkeorden" – antal i parentes: *Himalayan Vulture* (1) – se foto nedenfor, *Red-Headed Vulture* (1) – se foto nedenfor, *Slender-billed Vulture* (2), *White-rumped Vulture* (95), samt *Egyptian Vulture* (2). Ikke alle nævnte arter ses på dette billede (foto Chr. Glahder)

Efter en god frokost kørte vi videre mod vest. På vejen mod næste overnatningssted i Lumbini så vi fra bussen – det var slet ikke til at undgå – de første eksemplarer af *Sarus Crane*, der udmærker sig ved at være enorme, bogstaveligt talt mandshøje eller mere! De lever typisk i mindre grupper, og det blev til ganske mange af dem – både flyvende og på jorden – i løbet af de følgende dage hvor vi i høj grad færdedes i frodigt agerland, som synes at være disse kæmpefugles foretrukne habitat.

Andre bemærkelsesværdige nye arter denne dag var *Indian Grey Hornbill*, *Lesser Goldenback* og *Brown Shrike*.



Himalayan Vulture (foto Erik Heberg)



Red-headed Vulture (foto Erik Heberg)

Niende dag (mandag 25. november) – 92 arter – Lumbini

Denne dag tog vi skoene af sammen med hundredvis af nepalesiske og tilrejsende buddhister og besøgte fra morgenstunden Buddhas fødested, som markeres af et imponerende anlæg. Det var dog ikke så meget et udslag af pludselig fromhed fra vores side der tiltrak os netop dertil, som fordi stedet ligger i en stor park med et par interessante søer – og mange forskellige fugle. Efter passende reverens gik vi i gang med at studere begge dele nærmere. Her så vi især en række vandfugle og gribbe.

Frokosten indtoges i en mindre landsby nogen kørsel væk – på vejen dertil så vi bl.a. endnu nogle fouragerende flokke af *Sarus Crane*. Den største var på 14 fugle, og i alt så vi 29 på denne køretur.

Derfra kørte vi til en stor, nærmest rektangulær, reguleret sø på omkring en kilometers længde og måske en halv på tværs. Her var bl.a. ca. 2.000 *Common Coot* (Blishøne), ca. 200 *Red-Crested Pochard* (Rødhovedet And) samt nogle *Northern Shoveler* (Skeand) – et af de få steder på hele turen hvor vi så disse velkendte arter.

Dagen leverede også turens eneste eksemplarer af en hel række andre, for os mere eksotiske arter: *Grey Francolin*; *Black-headed Ibis*; *Indian Spotted Eagle*; *Pintail Snipe*; *Paddyfield Warbler*; *Brahminy Starling*, *Bank Myna*, *Crested Bunting*.

Andre bemærkelsesværdige nye turarter blev denne dag *Black Francolin*, *White-Bellied Drongo*, *Yellow Bittern*, *Yellow-footed Green Pigeon* og *Purple Sunbird*.

Tiende dag (tirsdag 26. november) – 65 arter – Lumbini til Bardia National Park

Dagens køretur var vores længste dagsmarch, en seriøst lang køredag hvor vi stort set sad i bussen fra morgen til aften, bortset fra spise- og strække-ben-pauser. Vi gjorde dog et holdt op ad formiddagen, hvor vi havde lejlighed til at vandre en lille kilometers vej ud langs en opstemmet sø med god bevoksning. Det var en behagelig spadseretur på rette tid, og der var gensyn med en række arter, men ellers var det så som så med fuglekigningen netop der – man bliver jo forvænt...

Heldigvis var køreturen varieret gennem både by og land, og med afvekslende landskaber, fra det tætbefolkede område omkring Lumbini, ad gode hovedveje gennem tyndtbefolkede, skovrige bjergområder, afvekslende med småbyer og landbrugsland med endnu flere Sarus Crane. Ved nogle grøfter langs markerne var vi ude af bussen og så fire flotte *Red Avadavat* ti *Black-headed Munia*.

Ud på eftermiddagen nåede vi til Bardia National Park ad den hovedvej som gennemskærer parken. Ved et militært checkpoint der markerer grænsen til parken, fik vi lov at vandre videre ad hovedvejen over en stor og høj dæmning som vejen løber ovenpå, så bussen kunne samle os op på den anden side. Der var ikke voldsomt meget vand i floden på denne årstid, men den må være stor i regntiden! Vi kunne bl.a. more os med at se på garialer (den Disney-agtige krokodilleart) som lå og drev den af nær dæmningen, samt diverse hejrer og andre vandfugle. Nogle så også en flok oddere (*Smooth-coated Otter*) ved floden.



Gharial, Chitwan (Foto Christian Glahder)

Da vi endelig nåede frem til vores eco-lodge, var mørket faldet på, og mens kufferterne blev læsset af, var enkelte så heldige at se en *Large-tailed Nightjar*.

Derudover gav hele dagen så få nye arter til turlisten at de alle kan nævnes her, nemlig: *Grey Francolin*, *White-eyed Buzzard* og *Oriental Pied Hornbill*.

Elleve dag (onsdag 27. november) – 80 arter – Bardia National Park

Vi stod op med solen og havde en lang dag i den særligt beskyttede del af parken, hvor der bl.a. lever tiger. Området er stort set moden skov, gennemskåret af nogle få store floder, som dog ikke havde meget vand i sig på denne tid af året. Dermed var der også nogle større, åbne, til dels græsbevoksede flader. P. gr. a.

tigrene var der ikke meget med at vandre rundt, transporten foregik stort set i gamle, åbne Landrovere, og vi fik ikke lov at gå særlig langt væk fra gruppen. Men nationalparkens guider var dygtige til at finde de interessante steder.

Trods disse begrænsninger og generelt begrænset udsyn i skoven, blev det denne første hele dag i parken til ikke mindre end femten nye turarter, heraf adskillige meget markante. Fremhæves bør den sjældne, globalt truede *Great Slaty Woodpecker* som er Nepals største spætte (ca. 25 % større end vores egen sortspætte). Også *Brown Fish Owl* var en meget spændende observation.

Af dagens 15 nye arter for turen, genså vi de seks den følgende dag. Ud over de allerede nævnte var de mest markante nok *Great Hornbill*, *Greater Goldenback* og *Storkbilled Kingfisher*. Herudover kan nævnes *Emerald Dove*, *Rufous Woodpecker*, både *Large* og *Common Woodshrike*, *Bay-backed Shrike* og både *Scaly* og *Tickell's Thrush*. Vi så mange friske spor og andre tegn på Tiger, men ikke selve tigerdyret!

Tolvte dag (torsdag 28. november) – 81 arter – Bardia National Park

Programmet for denne dag lignede til forveksling det for den foregående, dog med det twist at vore rangers gjorde mere målrettede forsøg på at finde en tiger til os. Vi opholdt os derfor i længere perioder (timer) på steder hvor tigrene plejer at holde til, komme ud for at drikke o.l. Imens så vi naturligvis også efter fugle, men vores mobilitet var generelt reduceret i forhold til dagen før. Interessant nok blev det totale antal af sete fuglearter denne dag ikke påvirket negativt heraf. Tigren så vi dog ikke...

Der kom (kun) yderligere fem arter i bogen som vi ikke havde set før: *Changeable Hawk Eagle*, *Jungle Owlet*, *Striated Grassbird*, *Bluethroat* samt *Yellow-breasted Greenfinch*.



Tiger tracking i Bardia – ja, det er poteaftryk af tiger dér i sandet! (Foto Christian Glahder). Og måske kommer der en hvis man bare venter længe nok ved floden (Foto Bent Koluda).

Trettende dag (fredag 29. november) – 97 arter – Bardia, Badhaiya Tal – og hjemrejse til Kathmandu

Denne dag skulle vi med flyet fra Nepalgunj tilbage til Kathmandu om aftenen, hvad der først krævede afgang fra nationalparken ved middagstid. Aftenen før diskuterede hele gruppen hvad formiddagen skulle bruges til. Elleve stemte for yderligere forsøg på at finde tigreren, mens to (Lars og Ole) foretrak at udforske området nær lodgen til fods. Så vi delte os efter anskuelser.

Efter endnu en tidlig morgenmad kørte de elleve afsted på "tigering" sammen med Rajendra og parkguiderne, mens de to lidt op ad formiddagen vandrede ud på birding i den nære omegn i selskab med lodgens egen meget lokalkendte guide.

Ingen af delene gav de store resultater: Ingen tiger, men dog nogle fugle – hvoraf en *Lesser Coucal* som ny tur-art sås på jeep-turen og hørtes omkring lodgens P-plads. Hjemmeholdet så bl.a. *Grey-breasted Prinia* og *Green Bee-eater* som andre havde set et par dage før, og som ny tur-art *Yellow-crowned Woodpecker*. Og så kom vi tæt på et par store hanelefanter der var på arbejde som lastbiler.

Efter frokost satte vi så kursen mod lufthavnen. På vejen kunne vi igen nyde udsigten fra dæmningen til fods med spredte hejrer – bl.a. en gammel og en ung *Striated Heron*, 23 *Black Stork* og andre vandfugle, samt turens sidste krokodiller og garialer. Men ellers styrede vi ad labyrintiske småveje gennem småbyer og over rismarker – bl.a. med jævnlige forekomster af *Sarus Crane* og en enkelt gruppe på fire *Painted Stork* (ny turart) – mod den store, lavvandede sø Badhaiya Tal, der er Ramsar-område. Her blev vi fornemt modtaget med blomsterkranse af områdets indbyggere. Søen var rig på de ænder, hønsefugle og andre vandfuglearter vi efterhånden var blevet fortrolige med.

Herfra kørte vi direkte til lufthavnen i Nepalgunj og fløj uden problemer tilbage til Kathmandu; vi var tilbage på det oprindelige hotel til en noget sen middag omkring kl. 21.

Fjortende dag (lørdag 30. november) – 46 arter – Kathmandu – Shivapuri

I løbet af fredag aften udviklede der sig lidt snak om mulighederne for en ikke-planlagt, mindre tur i Kathmandus udkant fra morgenstunden lørdag, hvor vores fly tilbage til Danmark først skulle afgå om aftenen. Det var især det at vi ikke havde haft held til at se Nepals eneste endemiske fugleart, *Spiny Babbler*, og at den vides at holde til i et bestemt område nær Shivapuri, ikke voldsomt langt fra hotellet, der ansporede denne flid. Det var ikke alle der var med på spøgen – og end ikke alle der nåede at høre om den – men en lille gruppe tog afsted før solopgang under Rajendras ledelse. Denne gruppe havde held til at se ikke mindre end otte turarter som vi havde misset ved tidligere ture i Kathmandus omegn. M.h.t. *Spiny Babbler* blev det dog kun til at høre den – på denne årstid er den svær at få at se da den ikke som i yngletiden sidder frit fremme og synger. Men bl.a. en *Rusty-cheeked Scimitar Babbler* og en *Golden Bush Robin* og et par *Yellow-Billed Blue Magpie* blev det også til, og de er ikke kedelige at se på, og gode at få på listen.

Ellers blev denne dag især brugt til afslapning, pakning, afsluttende møder, gruppefotos og deslige.

Vi sagde også et meget stort farvel og mange, mange tak til Rajendra Gurung, uden hvis uvurderlige indsats og lokalkendskab turen ikke havde været mulig. Og Rajendra sagde på gensyn – hvis nogen forstår et hint!

Klokken hen ad otte om aftenen checkede vi ind i lufthavnen, og hjemrejsen forløb ganske planmæssigt via Doha med ankomst til København tidligt søndag morgen 1. december.



Det meste af gruppen i afslappet mode i hotellets have i Bardia nationalpark (Foto: venlig tjener med Chr. Glahders apparat)

Samlet artsliste

Common Name	Scientfic Name
GALLIFORMES	
Phasianidae	
Black Francolin	<i>Francolinus francolinus</i>
Grey Francolin	<i>Francolinus pondicerianus</i>
Kalij Pheasant	<i>Lophura leucomelanos</i>
Red Junglefowl	<i>Gallus gallus</i>
Indian Peafowl	<i>Pavo cristatus</i>
ANSERIFORMES	
Anatidae	
Lesser Whistling Duck	<i>Dendrocygna javanica</i>
Bar-headed Goose	<i>Anser indicus</i>
Ruddy Shelduck	<i>Tadorna ferruginea</i>
Gadwall	<i>Anas strepera</i>
Eurasian Wigeon	<i>Anas penelope</i>
Mallard	<i>Anas platyrhynchos</i>
Northern Shoveler	<i>Anas clypeata</i>
Northern Pintail	<i>Anas acuta</i>
Common Teal	<i>Anas crecca</i>
Red-crested Pochard	<i>Rhodonessa rufina</i>
Common Pochard	<i>Aythya ferina</i>
Ferruginous Pochard	<i>Aythya nyroca</i>
Tufted Duck	<i>Aythya fuligula</i>
Goosander	<i>Mergus merganser</i>
Little Grebe	<i>Tachybaptus ruficollis</i>
Great Crested Grebe	<i>Podiceps cristatus</i>
Black-necked Grebe	<i>Podiceps nigricollis</i>
CICONIIFORMES	
Ciconiidae	
Painted Stork	<i>Mycteria leucocephala</i>

Asian Openbill	<i>Anastomus oscitans</i>
Black Stork	<i>Ciconia nigra</i>
Woolly-necked Stork	<i>Ciconia episcopus</i>
Lesser Adjutant * VU	<i>Leptoptilos javanicus</i>
Black-headed Ibis	<i>Threskiornis melanocephalus</i>
Red-naped Ibis	<i>Pseudibis papillosa</i>
Eurasian Spoonbill	<i>Platalea leucorodia</i>
Ardeidae	
Little Egret	<i>Egretta garzetta</i>
Grey Heron	<i>Ardea cinerea</i>
Purple Heron	<i>Ardea purpurea</i>
Great Egret	<i>Casmerodius albus</i>
Intermediate Egret	<i>Mesophoyx intermedia</i>
Cattle Egret	<i>Bubulcus ibis</i>
Indian Pond Heron	<i>Ardeola grayii</i>
Little Heron	<i>Butorides striatus</i>
Black-crowned Night Heron	<i>Nycticorax nycticorax</i>
Yellow Bittern	<i>Ixobrychus sinensis</i>
Cinnamon Bittern	<i>Ixobrychus cinnamomeus</i>
Little Cormorant	<i>Phalacrocorax niger</i>
Great Cormorant	<i>Phalacrocorax carbo</i>
Anhinga	
Oriental Darter	<i>Anhinga melanogaster</i>
FALCONIFORMES	
Falconidae	
Collared Falconet	<i>Microhierax caerulescens</i>
Common Kestrel	<i>Falco tinnunculus</i>
Black-winged Kite	<i>Elanus caeruleus</i>
Black-eared Kite	<i>Milvus (migrans) lineatus</i>
Black Kite	<i>Milvus migrans</i>
Osprey	<i>Pandion haliaetus</i>
Pallas's Fish Eagle * VU	<i>Haliaeetus leucoryphus</i>

Grey-headed Fish Eagle	<i>Ichthyophaga ichthyaetus</i>
Oriental Honey-buzzard	<i>Pernis ptilorhyncus</i>
Egyptian Vulture * <i>EN</i>	<i>Neophron percnopterus</i>
White-rumped Vulture * <i>CR</i>	<i>Gyps bengalensis</i>
Slender-billed Vulture * <i>CR</i>	<i>Gyps tenuirostris</i>
Himalayan Vulture	<i>Gyps himalayensis</i>
Cinereous Vulture	<i>Aegypius monachus</i>
Red-headed Vulture * <i>CR</i>	<i>Sarcogyps calvus</i>
Crested Serpent Eagle	<i>Spilornis cheela</i>
Eurasian Marsh Harrier	<i>Circus aeruginosus</i>
Hen Harrier	<i>Circus cyaneus</i>
Shikra	<i>Accipiter badius</i>
Besra	<i>Accipiter virgatus</i>
Eurasian Sparrowhawk	<i>Accipiter nisus</i>
White-eyed Buzzard	<i>Butastur teesa</i>
Himalayan Buzzard	<i>Buteo (buteo) burmanicus</i>
Long-legged Buzzard	<i>Buteo rufinus</i>
Indian Spotted Eagle * <i>VU</i>	<i>Aquila hastata</i>
Tawny Eagle	<i>Aquila rapax</i>
Steppe Eagle	<i>Aquila nipalensis</i>
Booted Eagle	<i>Hieraaetus pennatus</i>
Changeable Hawk Eagle	<i>Spizaetus cirrhatus</i>
Mountain Hawk Eagle	<i>Spizaetus nipalensis</i>
GRUIFORMES	
Rallidae	
Brown Crake	<i>Amauornis akool</i>
White-breasted Waterhen	<i>Amauornis phoenicurus</i>
Ruddy-breasted Crake	<i>Porzana fusca</i>
Purple Swampphen	<i>Porphyrio porphyrio</i>
Common Moorhen	<i>Gallinula chloropus</i>
Common Coot	<i>Fulica atra</i>
Gruidae	

Sarus Crane * VU	<i>Grus antigone</i>
Common Crane	<i>Grus grus</i>
Jacanidae	
Bronze-winged Jacana	<i>Metopidius indicus</i>
Charadriidae	
River Lapwing	<i>Vanellus duvaucelii</i>
Grey-headed Lapwing	<i>Vanellus cinereus</i>
Red-wattled Lapwing	<i>Vanellus indicus</i>
Little Ringed Plover	<i>Charadrius dubius</i>
Scolopacidae	
Pintail Snipe	<i>Gallinago stenura</i>
Spotted Redshank	<i>Tringa erythropus</i>
Common Redshank	<i>Tringa totanus</i>
Common Greenshank	<i>Tringa nebularia</i>
Green Sandpiper	<i>Tringa ochropus</i>
Wood Sandpiper	<i>Tringa glareola</i>
Common Sandpiper	<i>Actitis hypoleucos</i>
Temminck's Stint	<i>Calidris temminckii</i>
Laridae	
Pallas's Gull	<i>Larus ichthyaetus</i>
Brown-headed Gull	<i>Larus brunnicephalus</i>
Black-headed Gull	<i>Larus ridibundus</i>
COLUMBIFORMES	
Columbidae	
Common Pigeon	<i>Columba livia</i>
Ashy Wood Pigeon	<i>Columba pulchricollis</i>
Oriental Turtle Dove	<i>Streptopelia orientalis</i>
Spotted Dove	<i>Streptopelia chinensis</i>
Eurasian Collared Dove	<i>Streptopelia decaocto</i>
Emerald Dove	<i>Chalcophaps indica</i>
Yellow-footed Green Pigeon	<i>Treron phoenicoptera</i>

PSITTACIFORMES	
Psittacidae	
Alexandrine Parakeet	<i>Psittacula eupatria</i>
Rose-ringed Parakeet	<i>Psittacula krameri</i>
Plum-headed Parakeet	<i>Psittacula cyanocephala</i>
CUCULIFORMES	
Cuculidae	
Asian Koel	<i>Eudynamys scolopacea</i>
Centropodidae	
Greater Coucal	<i>Centropus sinensis</i>
STRIGIFORMES	
Tytonidae	
Barn Owl	<i>Tyto alba</i>
Strigidae	
Mountain Scops Owl	<i>Otus spilocephalus</i>
Brown Fish Owl	<i>Ketupa zeylonensis</i>
Collared Owlet	<i>Glaucidium brodiei</i>
Jungle Owlet	<i>Glaucidium radiatum</i>
Spotted Owlet	<i>Athene brama</i>
Caprimulgidae	
Large-tailed Nightjar	<i>Caprimulgus macrurus</i>
APODIFORMES	
Apodidae	
Himalayan Swiftlet	<i>Collocalia brevirostris</i>
White-rumped Spinetail	<i>Zoonavena sylvatica</i>
House Swift	<i>Apus affinis</i>
Crested Treeswift	<i>Hemiprocne coronata</i>
UPUPIFORMES	
Upupidae	

Common Hoopoe	<i>Upupa epops</i>
CORACIIFORMES	
Coraciidae	
Indian Roller	<i>Coracias benghalensis</i>
Alcedinidae	
Common Kingfisher	<i>Alcedo atthis</i>
Stork-billed Kingfisher	<i>Pelargopsis capensis</i>
White-throated Kingfisher	<i>Halcyon smyrnensis</i>
Crested Kingfisher	<i>Megaceryle lugubris</i>
Pied Kingfisher	<i>Ceryle rudis</i>
Meropidae	
Blue-bearded Bee-eater	<i>Nyctyornis athertoni</i>
Green Bee-eater	<i>Merops orientalis</i>
BUCEROTIFORMES	
Bucerotidae	
Indian Grey-Hornbill	<i>Ocyroceros birostris</i>
Oriental Pied-Hornbill	<i>Anthracoceros albirostris</i>
Great Hornbill	<i>Buceros bicornis</i>
PICIFORMES	
Megalaimidae	
Great Barbet	<i>Megalaima virens</i>
Brown-headed Barbet	<i>Megalaima zeylanica</i>
Lineated Barbet	<i>Megalaima lineata</i>
Blue-throated Barbet	<i>Megalaima asiatica</i>
Coppersmith Barbet	<i>Megalaima haemacephala</i>
Picidae	
Eurasian Wryneck	<i>Jynx torquilla</i>
Speckled Piculet	<i>Picumnus innominatus</i>
Grey-capped Pygmy Woodpecker	<i>Dendrocopos canicapillus</i>
Fulvous-breasted Woodpecker	<i>Dendrocopos macei</i>

Rufous Woodpecker	<i>Celeus brachyurus</i>
Lesser Yellownape	<i>Picus chlorolophus</i>
Greater Yellownape	<i>Picus flavinucha</i>
Grey-headed Woodpecker	<i>Picus canus</i>
Himalayan Goldenback	<i>Dinopium shorii</i>
Lesser Goldenback	<i>Dinopium benghalense</i>
Greater Goldenback	<i>Chrysocolaptes lucidus</i>
Great Slaty Woodpecker *VU	<i>Mulleripicus pulverulentus</i>
PASSERIFORMES	
Eurylaimidae	
Long-tailed Broadbill	<i>Psarisomus dalhousiae</i>
Corvidae	
Eurasian Jay	<i>Garrulus glandarius</i>
Yellow-billed Blue Magpie	<i>Urocissa flavirostris</i>
Red-billed Blue Magpie	<i>Urocissa erythrorhyncha</i>
Common Green Magpie	<i>Cissa chinensis</i>
Rufous Treepie	<i>Dendrocitta vagabunda</i>
Grey Treepie	<i>Dendrocitta formosae</i>
House Crow	<i>Corvus splendens</i>
Large-billed Crow	<i>Corvus macrorhynchos</i>
Indian Jungle Crow	<i>Corvus macrorhynchos culminatus</i>
Oriolidae	
Indian Golden Oriole	<i>Oriolus (oriolus) kundoo</i>
Black-naped Oriole	<i>Oriolus chinensis</i>
Black-hooded Oriole	<i>Oriolus xanthornus</i>
Maroon Oriole	<i>Oriolus traillii</i>
Campephagidae	
Large Cuckooshrike	<i>Coracina macei</i>
Black-winged Cuckooshrike	<i>Coracina melaschistos</i>
Small Minivet	<i>Pericrocotus cinnamomeus</i>
Long-tailed Minivet	<i>Pericrocotus ethologus</i>
Scarlet Minivet	<i>Pericrocotus flammeus</i>

Rhipiduridae	
Yellow-bellied Fantail	<i>Rhipidura hypoxantha</i>
White-throated Fantail	<i>Rhipidura albicollis</i>
White-browed Fantail	<i>Rhipidura aureola</i>
Aegithinidae	
Common Iora	<i>Aegithina tiphia</i>
Campephagidae	
Bar-winged Flycatcher-shrike	<i>Hemipus picatus</i>
Large Woodshrike	<i>Tephrodornis gularis</i>
Common Woodshrike	<i>Tephrodornis pondicerianus</i>
Laniidae	
Brown Shrike	<i>Lanius cristatus</i>
Bay-backed Shrike	<i>Lanius vittatus</i>
Long-tailed Shrike	<i>Lanius schach</i>
Grey-backed Shrike	<i>Lanius tephronotus</i>
Dicruridae	
Black Drongo	<i>Dicrurus macrocercus</i>
Ashy Drongo	<i>Dicrurus leucophaeus</i>
White-bellied Drongo	<i>Dicrurus caerulescens</i>
Bronzed Drongo	<i>Dicrurus aeneus</i>
Lesser Racket-tailed Drongo	<i>Dicrurus remifer</i>
Spangled Drongo	<i>Dicrurus hottentottus</i>
Greater Racket-tailed Drongo	<i>Dicrurus paradiseus</i>
Paridae	
Great Tit	<i>Parus major</i>
Green-backed Tit	<i>Parus monticolus</i>
Black-lored Tit	<i>Parus xanthogenys</i>
Yellow-browed Tit	<i>Sylviparus modestus</i>
Aegithalidae	
Black-throated Tit	<i>Aegithalos concinnus</i>
Plain Martin	<i>Riparia paludicola</i>

Barn Swallow	<i>Hirundo rustica</i>
Red-rumped Swallow	<i>Hirundo daurica</i>
Asian House Martin	<i>Delichon dasypus</i>
Alaudidae	
Rufous-winged Lark	<i>Mirafra assamica</i>
Oriental Skylark	<i>Alauda gulgula</i>
Pycnonotidae	
Red-whiskered Bulbul	<i>Pycnonotus jocosus</i>
Himalayan Bulbul	<i>Pycnonotus leucogenys</i>
Red-vented Bulbul	<i>Pycnonotus cafer</i>
White-throated Bulbul	<i>Alophoixus flaveolus</i>
Mountain Bulbul	<i>Hypsipetes maclellandii</i>
Black Bulbul	<i>Hypsipetes leucocephalus</i>
Cisticolidae	
Zitting Cisticola	<i>Cisticola juncidis</i>
Grey-breasted Prinia	<i>Prinia hodgsonii</i>
Jungle Prinia	<i>Prinia sylvatica</i>
Yellow-bellied Prinia	<i>Prinia flaviventris</i>
Sylviidae	
Chestnut-headed Tesia	<i>Tesia castaneocoronata</i>
Grey-bellied Tesia	<i>Tesia cyaniventer</i>
Aberrant Bush Warbler	<i>Cettia flavolivacea</i>
Paddyfield Warbler	<i>Acrocephalus agricola</i>
Clamorous Reed Warbler	<i>Acrocephalus stentoreus</i>
Thick-billed Warbler	<i>Acrocephalus aedon</i>
Common Tailorbird	<i>Orthotomus sutorius</i>
Common Chiffchaff	<i>Phylloscopus collybita</i>
Smoky Warbler	<i>Phylloscopus fulgiventis</i>
Tickell's Leaf Warbler	<i>Phylloscopus affinis</i>
Buff-barred Warbler	<i>Phylloscopus pulcher</i>
Ashy-throated Warbler	<i>Phylloscopus maculipennis</i>
Lemon-rumped Warbler	<i>Phylloscopus chloronotus</i>

Hume's Warbler	<i>Phylloscopus humei</i>
Greenish Warbler	<i>Phylloscopus trochiloides</i>
Whistler's Warbler	<i>Seicerus whistleri</i>
Grey-hooded Warbler	<i>Seicercus xanthoschistos</i>
Black-faced Warbler	<i>Abroscopus schisticeps</i>
Striated Grassbird	<i>Megalurus palustris</i>
Timaliidae	
White-throated Laughingthrush	<i>Garrulax albogularis</i>
White-crested Laughingthrush	<i>Garrulax leucolophus</i>
Striated Laughingthrush	<i>Garrulax striatus</i>
Grey-sided Laughingthrush	<i>Garrulax caeruleatus</i>
Streaked Laughingthrush	<i>Garrulax lineatus</i>
Chestnut-crowned Laughingthrush	<i>Garrulax erythrocephalus</i>
Rusty-cheeked Scimitar Babbler	<i>Pomatorhinus erythrogenys</i>
White-browed Scimitar Babbler	<i>Pomatorhinus schisticeps</i>
Streak-breasted Scimitar Babbler	<i>Pomatorhinus ruficollis</i>
Scaly-breasted Wren Babbler	<i>Pnoepyga albiventer</i>
Rufous-capped Babbler	<i>Stachyris ruficeps</i>
Striped Tit Babbler	<i>Macronous gularis</i>
Chestnut-capped Babbler	<i>Timalia pileata</i>
Yellow-eyed Babbler	<i>Chrysomma sinense</i>
Spiny Babbler	<i>Turdoides nipalensis</i>
Jungle Babbler	<i>Turdoides striatus</i>
Red-billed Leiothrix	<i>Leiothrix lutea</i>
Bar-throated Siva	<i>Minla strigula</i>
Rufous-winged Fulvetta	<i>Alcippe castaneiceps</i>
White-browed Fulvetta	<i>Alcippe vinipectus</i>
Nepal Fulvetta	<i>Alcippe nipalensis</i>
Rufous Sibia	<i>Heterophasia capistrata</i>
Stripe-throated Yuhina	<i>Yuhina gularis</i>
Rufous-vented Yuhina	<i>Yuhina occipitalis</i>
White-bellied Erpornis	<i>Erpornis zantholeuca</i>
Zosteropidae	

Oriental White-eye	<i>Zosterops palpebrosus</i>
Sittidae	
Chestnut-bellied Nuthatch	<i>Sitta castanea</i>
White-tailed Nuthatch	<i>Sitta himalayensis</i>
Velvet-fronted Nuthatch	<i>Sitta frontalis</i>
Wallcreeper	<i>Tichodroma muraria</i>
Sturnidae	
Chestnut-tailed Starling	<i>Sturnus malabaricus</i>
Brahminy Starling	<i>Sturnus pagodarum</i>
Asian Pied Starling	<i>Sturnus contra</i>
Common Myna	<i>Acridotheres tristis</i>
Bank Myna	<i>Acridotheres ginginianus</i>
Jungle Myna	<i>Acridotheres fuscus</i>
Turdidae	
Blue-capped Rock Thrush	<i>Monticola cinclorhynchus</i>
Blue Rock Thrush	<i>Monticola solitarius</i>
Blue Whistling Thrush	<i>Myophonus caeruleus</i>
Pied Thrush	<i>Zoothera wardii</i>
Scaly Thrush	<i>Zoothera dauma</i>
Tickell's Thrush	<i>Turdus unicolor</i>
White-collared Blackbird	<i>Turdus albocinctus</i>
Dark-throated Thrush	<i>Turdus atrogularis</i>
Red-throated Thrush	<i>Turdus ruficollis</i>
Dusky Thrush	<i>Turdus naumanni</i>
Muscicapidae	
Taiga Flycatcher	<i>Ficedula albicilla</i>
Snowy-browed Flycatcher	<i>Ficedula hyperythra</i>
Little Pied Flycatcher	<i>Ficedula westermanni</i>
Verditer Flycatcher	<i>Eumyias thalassina</i>
Small Niltava	<i>Niltava macgrigoriae</i>
Rufous-bellied Niltava	<i>Niltava sundara</i>
Pale-chinned Flycatcher	<i>Cyornis poliogenys</i>

Blue-throated Flycatcher	<i>Cyornis rubeculoides</i>
Grey-headed Canary Flycatcher	<i>Culicicapa ceylonensis</i>
Bluethroat	<i>Luscinia svecica</i>
Golden Bush Robin	<i>Tarsiger chrysaeus</i>
Oriental Magpie Robin	<i>Copsychus saularis</i>
White-rumped Shama	<i>Copsychus malabaricus</i>
Blue-fronted Redstart	<i>Phoenicurus frontalis</i>
White-capped Redstart	<i>Chaimarrornis leucocephalus</i>
Plumbeous Water Redstart	<i>Rhyacornis fuliginosus</i>
Little Forktail	<i>Enicurus scouleri</i>
Spotted Forktail	<i>Enicurus maculatus</i>
Common Stonechat	<i>Saxicola torquata</i>
White-tailed Stonechat	<i>Saxicola leucura</i>
Pied Bushchat	<i>Saxicola caprata</i>
Grey Bushchat	<i>Saxicola ferrea</i>
Brown Rock Chat	<i>Cercomela fusca</i>
Irenidae	
Orange-bellied Leafbird	<i>Chloropsis hardwickii</i>
Dicaeidae	
Fire-breasted Flowerpecker	<i>Dicaeum ignipectus</i>
Nectariniidae	
Purple Sunbird	<i>Nectarinia asiatica</i>
Green-tailed Sunbird	<i>Aethopyga nipalensis</i>
Black-throated Sunbird	<i>Aethopyga saturata</i>
Crimson Sunbird	<i>Aethopyga siparaja</i>
Fire-tailed Sunbird	<i>Aethopyga ignicauda</i>
Passeridae	
House Sparrow	<i>Passer domesticus</i>
Eurasian Tree Sparrow	<i>Passer montanus</i>
Motacillidae	
White Wagtail	<i>Motacilla alba</i>
White-browed Wagtail	<i>Motacilla maderaspatensis</i>

Citrine Wagtail	<i>Motacilla citreola</i>
Grey Wagtail	<i>Motacilla cinerea</i>
Paddyfield Pipit	<i>Anthus rufulus</i>
Long-billed Pipit	<i>Anthus similis</i>
Ploceidae	
Baya Weaver	<i>Ploceus philippinus</i>
Estrildidae	
Red Avadavat	<i>Amandava amandava</i>
White-rumped Munia	<i>Lonchura striata</i>
Scaly-breasted Munia	<i>Lonchura punctulata</i>
Black-headed Munia	<i>Lonchura malacca</i>
Fringillidae	
Yellow-breasted Greenfinch	<i>Carduelis spinoides</i>
Common Rosefinch	<i>Carpodacus erythrinus</i>
Emberizidae	
Crested Bunting	<i>Melophus lathami</i>
Yellow-breasted Bunting *	<i>Emberiza aureola</i>

Ialt 321 fugglearter