

T A N Z A N I A

*21. januar - 5.februar 2025
- en stortur med DOF Travel*

*Golden-
winged
Sunbird
Ngorongoro*

Foto: Ingelise Aarøe Petersen



Forord

DOF Travels 16 dage lange rejse til det nordlige Tanzania i dagene 21. januar- 5. februar 2025 blev et sandt afrikansk eventyr med et væld af fine oplevelser med fugle, store pattedyr og betagende afrikanske landskaber. I alt noterede vi 413 forskellige fuglearter og 42 pattedyrarter.

Vejret var mere regnfuldt end normalt, og på lange strækninger skøjtede vores landcruisere rundt på de mudrede veje. For fuglelivet var regnen imidlertid en stor fordel. Mange intra-afrikanske trækfugle opsøger jo de våde savanne-områder og grasslands. Uden det fugtige vejr, havde vi næppe set så mange gøge, biskopper, whydaher og widow-birds, vagtler mv.

Det var endnu en gang slående, at det er klodens fattige lande i bl.a. Afrika, der yder den største indsats for at bevare den globale biodiversitet. Tanzania er jo ikke nogen ødemark. Her er knap 70 millioner mennesker og befolkningstætheden er i gennemsnit over 70 pr. kvadratkilometer. Alligevel har Tanzania lagt godt 40 pct af landarealet ud til urørt natur. For at det kan lade sig gøre, skal der tjenes penge på naturen, og derfor er det dyrt at besøge nationalparkerne i Tanzania.

Hvis man som europæer gerne vil bevare Østafrikas enestående natur, gøres det derfor bedst ved at rejse til Østafrika og besøge de mange fine nationalparker. Det er en win-win situation, hvor de besøgende turister får unikke naturoplevelser og samtidig sikrer indtægterne fra turismen, at der er god økonomi i at beskytte naturen.

Broderparten af rejsen blev brugt i Serengeti, der med rette er verdensberømt. Serengeti-området, der udover Serengeti Nationalpark også omfatter naboområdet Ngorongoro Conservation Area samt Masai Mara i Kenya, huser den største koncentration af vilde pattedyr i verden, idet halvanden million gnuer sammen med flere hundrede tusinde zebraer og antiloper året rundt trækker rundt efter regnen og dermed årstidens mest gunstige græsningsarealer.

På verdensplan udgøres 96 pct af den samlede biomasse af pattedyr nu af mennesker og deres husdyr, mens kun 4 pct. udgøres af vilde dyr, så den store koncentration af vilde pattedyr i Serengeti er på globalt plan helt enestående.

Udover Serengeti og Ngorongoro, besøgte vi også de kendte nationalparker Tarangire, Arusha og Lake Manyara samt lidt mere ukendte naturområder som Larks Plains nord for Arusha og Lake Duluti øst for Arusha.

At Tanzania byder på urørt natur i den helt store skala er naturligvis ikke kun en fordel for de mange pattedyr. Her er også et utroligt rigt fugleliv – og modsat fuglelivet i regnskovene, hvor der også er mange fuglearter, er det nemt at se fuglene på savannen i Østafrika.

En fugle- og naturrejse til Tanzania er derfor en sjældent helstøbt naturoplevelse.

At rejsen blev en succes, skyldes ikke mindst vores lokale samarbejdspartner – Cisticola Tours, der arrangerer fuglerejser over hele Østafrika. På storturen med DOF Travel var Cisticola Tours repræsenteret af vores to chauffører, Alex og Peter, samt vores guide, biolog og indehaver af Cisticola Tours - Washington Wachira.

Cisticola Tours er det bedste fugleguide-firma jeg nogen sinde har arbejdet sammen med, og Cisticola Tours fortjener derfor et par ord med på vejen. Virksomheden er grundlagt af



Washington Wachira – en af de dygtigste ornitologer i Østafrika, var vores lokale guide på rejsen.

Washington Wachira, der er uddannet biolog fra Kenyatta-universitetet i Nairobi. Allerede som studerende etablerede Washington Wachira sin guidevirksomhed, og i en alder af 32 år har han nu to safari-firmaer, der er specialiseret i henholdsvis fuglesafarier (Cisticola Tours) og pattedyr-safarier (Bovid Safaris).

Cisticola Tours er i dag aktive i Kenya, Tanzania, Rwanda og Uganda. I de kommende år planlægger Washingtton Washira at udvide guidevirksomheden til Zambia og Malawi.

Washington Waschira er formand for Østafrikas Raritetskomite - svarende til det danske SU, der godkender sjældne fugles forekomster i hele Østafrika. Han har også stået i



Vores to dygtige chauffører, Alex og Peter. Chaufførerne hos Cisticola Tours kan meget mere end at køre i bil. De har normalt videregående uddannelser inden for natur og turisme. Derudover skal de også være gode mekanikere og gode til sprog. Alex talte således spansk og Peter kinesisk udover engelsk, swahili og lokale sprog.

spidsen for Atlas-projektet, der har kortlagt Kenyas ynglefugle

Hans omfattende viden rækker langt udover fuglene, bl.a. har Washington Wachira opdaget et nyt krybdyr for verden - en agame i det nordlige Kenya. Han samarbejder derudover med National Geographic, og er også stærkt engageret i det lokale naturbeskyttelsesarbejde.

Endelig er Washington Wachira også sponsor for Kenya og Uganda Women Birders, hvor unge kvinder under uddannelse lærer at se på fugle, så de kan blive videreuddannet til safariguider med speciale i fugle.

Deltagerne i denne storslåede rejse var: Kirsten Marie Haugstrup Jensen, Jens Haugstrup Jensen, Per Boje, Lis Kastrup, Erik Vikkelsø Rasmussen, Birthe Rasmussen, Ingelise Aarøe Petersen, Hans Drostgaard, Lene Juliussen, Grethe Werner Mogensen, Mogens Sloth Nielsen, Kirsten Lundsby Hansen og Søren Skov (turleder),
Med tak for en god rejse.

Søren Skov



***DOF Travel tog kanoer i brug, da Lake Duluti ved Arusha skulle udforskes.
Foto: Søren Skov***

Rejsen dag for dag

21. januar 2025

Vi mødtes ved middagstid i Københavns Lufthavn i Kastrup. Herfra fløj vi kl. 15.15 videre med Qatar Airways til Doha, hvor vi ankom kl. 23.30. Her skulle vi skifte fly og måtte derfor vente på vores næste forbindelse – ligeledes med Qatar Air

22. januar

Fra Doha fløj vi kl. 1.55 videre til Kilimanjaro Airport ved Arusha kl. 7.40. Ved ankomsten blev vi modtaget af vores to chauffører fra Cisticola Tours. Efter at vi havde fordelt i de to ventende biler, kørte vi ind til Arusha – den traditionelle safarihovedstad i det nordlige Tanzania, som nu har udviklet sig til en moderne storby. Undervejs måtte vi stoppe flere gange for spændende fugle – bl.a. Grasshopper Buzzard og Pygmy Falcon. I Arusha indlogerede vi os på vores hotel, Arusha Planet Lodge. Her stødte vores lokale guide, Washington Wachira til, da han var fløjet ind til Arusha samme morgen fra Nairobi. Da vi alle var trætte efter den lange flyrejse, slappede vi af på hotellet frem til om eftermiddagen, hvor vi tog på tur til Lake Duluti – en smuk kratersø omgivet af skov. Vi fordelte os i små kanoer og roede derefter langs søbredden. Her så vi Taveta Golden Weaver, Grosbeak Weaver, Silvery-cheeked Hornbill, Crowned Hornbill, Giant Kingfisher og Palm-nut Vulture.



Med en lokal masai som guide i spidsen vandrede DOF Travel-holdet ud på de tørre "Lark Plains". Foto: Søren Skov

23. januar

Morgenmad klokken syv og afsted klokken otte. Det blev derpå faste tider for hele rejsen. Dagens mål var den fine Arusha Nationalpark ved Mt. Meru øst for Arusha. En meget flot nationalpark med højlandsskov, søer, højtliggende savanne og et rigt fugleliv. Højdepunktet var uden tvivl en vandring sammen med en ranger – her sås bl.a. vortesvin og giraffer på få meters afstand foruden mange fine fugle, bl.a. rejsens første krontraner. I vådområderne sås bl.a. fine damklirer. Om aftenen overnattede vi på ny i Arusha Planet Lodge.

24. januar

Nu begyndte den store rundrejse. Dagens mål var det store flade sletteområde, Engikaret, med tør savanne 45 km nord for Arusha. Dette område kaldes populært for "Lark Plains", da her er en sjælden rigdom på lærker - bl.a. den sjældne, endemiske Beesley's Lark, som vi ved hjælp af lokale masai-guider fik set meget fint. Derudover sås bl.a. Short-tailed Lark, Foxy Lark og Athi Short-toed Lark samt to arter sandhøns. Først på eftermiddagen brød vi op og kørte til Karatu, hvor vi overnattede på Karatu Bougainvillea Lodge øst for Ngorongoro.

25. januar

Afsted, afsted. Vi forlod byen og kom snart til gaten i højlandsskoven ved Ngorongoro.



Ved ankomsten til vores lodge, Embalakai Authentic Camp, blev vi budt velkommen af dansende masaier. Foto: Søren Skov

Conservation Area. Mens chaufførerne havde travlt med at få ordet tilladelser og andet papir-arbejde ved gaten, kiggede vi andre på fugle. Her kunne vi bl.a. glæde os over en fin Ayres Hawk Eagle. Derpå videre langs kraterranden, hvor vi stoppede ved et udsigtspunkt, hvor vi kunne se ned på savannen nede på kraterbunden. Her sås bl.a. rejsens første næsehorn på lang afstand. Vi forlod snart krater-randen og dermed højlandsskoven og kom nu til savannen i Ngorongoro Conservation Area, hvor vi mødte enorme mængder af gnuer og zebraer på vandring. Der var naturligvis også mange fugle – her imponerede de



Serengeti i en nøddeskal. Han-løve med gnuer og zebraer i baggrunden. Serengeti-økosystemet, der udover Serengeti Nationalpark også omfatter Ngorongoro Conservation Area og Masai Mara i Kenya, huser den største koncentration af vilde pattedyr i verden. Foto: Søren Skov

mange koritrapper og de mange rovfugle. Efter gaten til Serengeti kørte vi ind i det centrale Serengeti med de karakteristiske stenede kopjes. Sidst på dagen ankom vi til vores lodge i det centrale Serengeti - Embalakai Authentic Camp, der skulle være vores hjem i de kommende tre nætter.

26 – 27 januar.

Dejlige dage, hvor vi udforskede det centrale Serengeti. Forud for vores ankomst havde det regnet meget, og savannen var derfor frodig og grøn. Mange hjulspor var mudret, så det var en noget ujævn kørsel. Vejret var stadig fugtigt med byger ind i mellem, men det hindrede ikke de fine oplevelser i at stå i kø.

I regnfulde perioder kan det være svært at finde de plettede katte, men vi så både gepard og leopard. Dertil kommer mængder af de almindelige pattedyr – bl.a. en stor koncentration af flodheste.

Blandt de mange fugle gjorde de mange vævere, bishops og whydaher i deres flotte yngledragter samt de mange black coucals et stort indtryk. Derudover havde vi også fine observationer af de endemiske Masai Apalis, Grey-crested Helmet Shrike og Grey-breasted Spurfowl.



Frokostpause ved en rasteplass i Serengeti. Der er i dag flere rasteplasser og dermed også mulighed for at spise ved borde og stole og besøge et rigtigt toilet. Sådan var det ikke førhen. Foto: Søren Skov

28. januar.

Vi forlod vores fine camp og kørte nu mod Nduto Plain, der økologisk set er den mest spændende del af Serengeti, selv om det ligger lige uden for nationalparkgrænsen. I stedet er Nduto beskyttet som en del af Ngorongoro Conservation Area.

Undervejs mødte vi på ny enorme flokke af gnuer på vandring. Særligt i områderne lidt nord og nordvest for Nduto. Der var faktisk mange flere gnuer her end ved selve Nduto Plains, der ellers er berømt for at være stedet, hvor Serengetis gnuer – omkring halvanden million – samles i perioden januar-marts for at føde deres kalve.

Vi fik fortalt, at som følge af megen regn i december-januar havde de fleste gnuer i år født deres kalve i begyndelsen af januar og var derfor allerede begyndt at vandre mod det vestlige Serengeti.

Blandt fuglene bemærkede vi bl.a. mange hedehøge, fine øregribbe, sekretærfugle, bishops, og meget, meget mere.

Da vi nærmede os Nduto, var der flere små og store søer med mange vadefugle – og ikke mindst meget mudrede veje.

Vi overnattede ved Nduto Gnu Camp, der skulle være vores hjem i de næste to nætter.



På mudrede hjulspor cruisede vi gennem Nduto-området for at se de mange fine fugle – bl.a. den sjældne Chestnut-banded Plover. Foto: Søren Skov

29. januar

Hele dagen i Nduto-området. Dagen bød bl.a. på en fin observation af den sjældent sete Serval – en graciøs kat, der er på størrelse med en lille los. Derudover fine chestnut-banded plover, damklirer og mange andre vadefugle samt krontraner, begge flamingoer, løver og fine gribbe.

Sidst på dagen satte det ind med et stort regnvejr.

30. januar.

Den kraftige regn fortsatte om natten, og de i forvejen mudrede veje var derfor blevet nærmest ufremkommelige, da vi begav os ud på de oversvømmede hjulspor. Vores to landcruisere viste sig imidlertid fra deres bedste side, og kørte uden besvær gennem enorme mængder af vand og mudder.

Vi fortsatte mod nord gennem Ngorongoro Conservation Area. Efterhånden holdt regnen op, og det blev tid til flere fine stop, bl.a. i kraterrandens bjergregnskov, der imponerede med mange fine småfugle.

Vi overnattede ved Ngorongoro Kuhama Camp, der ligger få hundrede meter fra den ene nedkørsel til kraterbunden.

31. januar.

Hvilken fin dag. Da vores camp lå tæt på nedkørslen, var vi hurtigt nede i Ngorongoro krateret. Trods truende skyer og lidt småregn ind i mellem, stod de fine oplevelser i kø – flotte næsehorn, mængder af fugle og ikke mindst stemningen nede i Ngorongoro-krateret, som er berømt som et af verdens naturvidundere.



Savannen nede i Ngorongoro-krateret er gennem mere end et halvt hundrede år blevet skildret i utallige naturfilm. Foto: Søren Skov.

Krater-randen ligger i omkring 2000 meters højde er derfor domineret af højlandsregnskov, men da krateret er 600 meter dybt, er der savanne nede på kraterbunden, der omfatter 260 kvadratkilometer.

Savannen nede i Ngorongoro-krateret huser alle de kendte dyr fra Østafrikas natur – her er løver, sorte næsehorn, geparder, leopard, flamingoer, zebraer, gnuer og flodheste. Kun girafferne mangler, da skrænterne er så stejle, at girafferne ikke kan gå derned.

Udover de mange dyr så vi også krontraner, begge flamingoer, sultanhøns, kamblishøne, terner og godt med Fan-tailed Widowbirds. Sidst på eftermiddagen forlod vi Ngorongoro krateret og kørte til Karatu Bougaivillea Lodge, hvor vi overnattede.

1. februar

Fra Karatu fortsatte vi om morgenen til den nærliggende Lake Manyara Nationalpark. Skoven i nationalparken huser usædvanligt mange figentræer, og derfor er her også usædvanligt mange hornbills. Bl.a. sås Ground Hornbill fint.

Derudover sås Narina Trogon og Verreaux Eagle sås samt træklatrende løver, som Lake Manyara er kendt for. Lake Manyara kan i perioder også huse mange flamingoer, men vandstanden var for høj til flamingoer, så dem så vi ikke noget til.

Om eftermiddagen forlod vi Lake Manyara og kørte til den komfortable Lake Burunge Lodge, der ville være vores hjem i de næste to dage.

2. februar

Først på dagen udforskede vi kulturlandskabet omkring Burunge med marker, krat og små vådområder. Her sås bl.a. mange vævere og bishops. Derefter besøgte vi den vestlige del



Hele DOF-Travel holdet ved Embalakai Authentic Camp

af Tarangire Nationalpark, som bl.a. imponerede med sine mange smukke baobab-træer og mange elefanter. Her var også godt med fugle, bl.a. den endemiske Ashy Starling.

3. februar

Nu var det tid til at forlade Burunge Lodge og i stedet køre dybere ind i Tarangire.

Inden vi forlod Burunge området, besøgte vi først søbredden ved Burunge, og kunne her glæde os mange fine vadefugle og begge arter flamingoer.

Derpå fortsatte vi til gaten og kørte nu ind i hjertet af Tarangire. Endnu en gang blev vi betaget af den smukke baobab-savanne og rigdommen på dyr og fugle. Desværre var her også mange tetse-fluer, der med sine smertefulde bid var en sand plage. Vi overnattede i den dejlige Tarangire Baobab Camp, hvor African Scops Owl tog venligt imod os.

4. februar

Alt har en ende, og nu var det tid til at tage afsked med Tanzania. Vi kørte ud gennem Tarangire med ganske få stop og satte derpå kurs mod Kilimanjaro Airport ved Arusha. Vi spiste sen frokost på et hotel nær lufthavnen, og ankom derfor til lufthavnen ved 15.30-tiden. Herfra fløj næsten hele gruppen hjem til Danmark med Qatar Airlines, idet var afgang kl. 18.10 til Doha, hvor der midt om natten var flyskifte til København. Kirsten og Søren blev dog i Tanzania lidt endnu og fløj samme aften videre til Zanzibar.

5. februar

Hovedparten af gruppen ankom til Kastrup kl. 6.40 om morgenen. Kirsten og Søren opholdt sig først nogle dage på Zanzibar og derefter på Mafia Island, hvor de bl.a. så hvalhajer, krabbeædere mv, inden de rejste hjem til Danmark



Lilac-breasted Roller – en karakterfugl for savannen i Østafrika. Foto: Søren Skov



Knob-billed Goose, Tarangire, Foto: Søren Skov

Fugle set på rejsen

Systematikken følger den udleverede checkliste fra Cisticola Tours – men med bemærkninger omkring flere arter/racer om deres status.

Common Ostrich (*Struthio camelus*)

Masai-struds

Ret almindelig i den åbne savanne. Set på fem af rejsens dage med op til 6 fugle om dagen

White-faced Whistling-Duck (*Dendrocygna viduata*)

Nonnetræand

Set på fem af rejsens dage med op til fire fugle om dagen.

Knob-billed Duck (*Sarkidiornis melanotos*)

En han sås to dage i træk i Tarangire. Derudover sås to fugle ved vandhul i Tarangire.

Egyptian Goose (*Alopochen aegyptiaca*)

Nilgås

Almindelig. Set på 11 af rejsens dage.

Spur-winged Goose (*Plectropterus gambensis*)

Sporegås

Fire fugle sås i Ngorongoro, Desuden en enkelt fugl i Tarangire



Den endemiske Grey-breasted Spurfowl sås almindeligt i Serengeti. Den var særlig talrig i Nduto-området. Foto: Ingelise Aarøe Petersen.

Blue-billed Teal (*Anas hottentota*)

Hottentot-and

Set på to af rejsens dage med henholdsvis tre og to fugle. Blev førhen kaldt for Hottentot Teal.

Cape Teal (*Anas capensis*)

Kapand

Set på fem af rejsens dage. Det største antal var 110 i Arusha Nationalpark. Særlig talrig ved saltsøer.

Northern Shoveler (*Anas clypeata*)

Skeand

150 fugle sås i vådområderne i bunden af Ngorongoro-krateret.

Red-billed Duck (*Anas erythrorhyncha*)

Rødnæbbet And

Set på to af rejsens dage.

Southern Pochard (*Netta erythrorphthalma*)

40 fugle sås i Arusha Nationalpark

Helmeted Guineafowl (*Numida meleagris*)

Perlehøne

Almindelig på savannen. Set på 11 af rejsens dage.

Crested Francolin (*Ortygornis sephaena*)

Topfrankolin

En ret almindelig savanne-frankolin. Set på fem af rejsens dage.



Speckled Pigeon var almindelig i byer og ved mange bygninger. Foto: Ingelise Aarøe Petersen

Coqui Frankolin (*Campocolinus coqui*)
To fugle sås i Ngorongoro Conservation Area

Coqui Frankolin

Common Quail (*Coturnix coturnix*)
En enkelt fugl sås med sikkerhed i Serengeti.

Vagtrel

Harlequin Quail *Coturnix delegorguei*
Set på fire af rejsens dage – typisk flygtige iagttagelser af opflyvende fugle fra bil i fart. Desuden hørtes flere ubestemte vagtler, der var enten denne art eller den almindelige vagtel.


Harlekinvagtrel

Hildebrandt's Spurfowl *Ptermistis hildebrandti*
Ret almindelig i skove/tæt bevokset savanne. Vi så den på tre af rejsens dage.

Yellow-necked Spurfowl (*Ptermistis leucoscepus*)
Ret almindelig i de fleste savanne-områder i Østafrika. Vi så den på fire rejsens dage. Sås ikke i Serengeti.

Gulstrubet Sporehøne

Grey-breasted Spurfowl (*Ptermistis rufopictus*)
Endemisk i det nordlige Tanzania. Almindelig i Serengeti/Nduto-området. Set på fem af rejsens dage med op til 15 fugle om dagen.



Lesser Flamingo: Ngorongoro-krateret. Bemærk det mørke næb. Foto: Søren Skov.

Red-necked Spurfowl (*Ptermistis afer*)

Set på fire af rejsens dage med op til fem fugle om dagen.

Greater Flamingo (*Phoenicopterus roseus*)

Set på fem af rejsens dage, idet den typisk sås i alle de salt-og sodasøer, hvor vi så flamingoer. Det højeste antal var omkring 200 om dagen.

Lesser Flamingo (*Phoenicopterus minor*)

I lighed med sin større fætter set på fem af rejsens dage, idet den typisk sås i alle de salt-og sodasøer, hvor vi så flamingoer. Den er dog langt mere talrig end Greater Flamingo. Både ved Ngorongoro og ved Lake Burunge sås omkring 5000 fugle.

Little Grebe (*Tachybaptus ruficollis*)

Lille Lappedykker

Set på tre af rejsens dage. Det største antal var 500 Arusha Nationalpark.

Eared Grebe (*Podiceps nigricollis*)

Sorthalset Lappedykker

1 Nduto-søerne

Rock Pigeon (*Columba livia*)

Klippedue

Forvildede tamduer sås almindeligt i byerne

Speckled Pigeon (*Columba guinea*)

Guineadue

Almindelig. Ses især ved bygninger og i byer. Set på fem af rejsens dage.

Rameron Pigeon (*Columba arquatrix*)

Olivendue

Set på tre af rejsens dage med 1-2 fugle hver dag. Alle observationer er fra bjergregnskoven ved Ngorongoro. Kaldes også for Olive Pigeon

Dusky Turtle Dove (*Streptopelia lugens*)

To fugle af denne mørke Streptopelia-due sås i den højtliggende del af Ngorongoro Conservation Area

African Mourning Dove (*Streptopelia decipiens*)

Guløjet Skoggerdue

Almindelig i tør savanne. Set på fire af rejsens dage.

Ring-necked Dove (*Streptopelia capicola*)

Savanneskoggerdue

En karakterfugl i den tørre savanne. Set på ni af rejsens dage.

Red-eyed Dove (*Streptopelia semitorquata*)

Røddøjet Skoggerdue

Almindelig i frodig bevoksning såsom skov, galleriskov, haver ved lodges mv. Set på syv af rejsens dage

Laughing Dove (*Streptopelia senegalensis*)

Senegaldue

Almindelig. Set på 11 af rejsens dage.

Emerald-spotted Wood-Dove (*Turtur chalcospilos*)

Smaragdpletue

Almindelig i den tørre savanne. Set/hørt på otte af rejsens dage.



Chestnut-bellied Sandgrouse sås i flere store flokke. "Lark Plains". Foto: Søren Skov



Yellow-throated Sandgrouse, "Lark Plains." Foto: Søren Skov.



Koritrappe i display med gnuer i baggrunden. Ngorongoro Conservation Area. Foto: Ingelise Aarøe Petersen.

Namaqua Dove (*Oena capensis*)

Namaquadove

To fugle set Burunge/Tarangire

African Green-Pigeon (*Treron calvus*)

Papegøjedue

En enkelt fugl sås i Ngorongoro Conservation Area

Chestnut-bellied Sandgrouse (*Pterocles exustus*)

Brunbuget Sandhøne

200 sås ved "Lark Plains" nord for Arusha

Yellow-throated Sandgrouse (*Pterocles gutturalis*)

Gulstrubet Sandhøne

15 fugle sås ved "Lark Plains" nord for Arusha

Black-faced Sandgrouse (*Pterocles decoratus*)

Hvidbrystet Sandhøne

Set på tre af rejsens dage med 2-3 fugle om dagen.

Kori Bustard (*Ardeotis kori*)

Koritrappe

Overraskende talrig – især i Serengeti/Ngorongoro Conservation Area. Set på ni af rejsens dage med op til 17 fugle om dagen.

White-bellied Bustard (*Eupodotis senegalensis*)

Rusttoppet Trappe

Set på to af rejsens dage – begge gange med to fugle.



White-bellied Bustard, Serengeti. Foto: Ingelise Aarøe Petersen.



Hartlaub's Turaco. Foto: Ingelise Aarøe Petersen.



Spotted Cuckoo. (Skadegøg). Serengeti. Foto: Ingelise Aarøe Petersen.

Black-bellied Bustard (*Lissotis melanogaster*)

Set på seks af rejsens dage med op til fire fugle om dagen..

Sortbuget Trappe

Hartlaubs Bustard *Lissotis hartlaubii*

En enkelt sås 29. januar i Nduto-området.

Sølvtrappe

Schalow's Turaco (*Tauraco schalowi*)

Set på tre af rejsens dage. Alle iagttagelser er fra Ngorongoro

Hartlaub's Turaco (*Tauraco hartlaubi*)

Tilknyttet højlandsskov. En enkelt fugl sås ved Lake Duluti.

Hartlaub's Turako

Bare-faced Go-away-bird (*Corythaixoides personatus*)

Set på fem af rejsens dage. Er generelt mere vestlig i udbredelsen end den følgende art.

Maskelarmfugl

White-bellied Go-away-bird (*Corythaixoides leucogaster*)

Set på fire af rejsens dage. Det højeste antal var 5 Tarangire.

Hvidbuget Larmfugl



Dideric Cuckoo: Foto: Ingelise Aarøe Petersen.

White-browed Coucal (*Centropus superciliosus*)

Hvidbrynet Sporegøg

Almindelig. Set på 12 rejsens dage med op til 10 fugle om dagen.

Black Coucal (*Centropus grilli*)

Sort Sporegøg

Set på fire af rejsens dage med til otte fugle om dagen.

Hartlaub's Turaco. Lake Duluti. Foto: Ingelise Aarøe Petersen.

Great Spotted Cuckoo (*Clamator glandarius*)

Skadegøg

To iagttagelser – hver gang af en enkelt fugl.

Levaillant's Cuckoo (*Clamator leveillantii*)

Set på tre af rejsens dage – hver gang med en enkelt fugl.

Jacobin Cuckoo (*Clamator jacobinus*)

Jacobinergøg

Set på tre af rejsens dage med 1-2 fugle om dagen.

Dideric Cuckoo (*Chrysococcyx caprius*)

Smaragdgøg

Meget almindelig. Set og navnlig hørt på 11 af rejsens af rejsens dage med op til 15 fugle om dagen. Den gode forekomst af denne og de andre gøge skyldes den megen regn

Klaas's Cuckoo (*Chrysococcyx klaas*)

Hvidbuget Smaragdgøg

Set og hørt på syv af rejsens dage.



White-browed Coucal optrådte talrigt på rejsen. Foto: Ingelise Aarøe Petersen.

African Emerald Cuckoo (*Chrysococcyx cupreus*)

To syngende fugle hørt ved henholdsvis Lake Duluti og Arusha Nationalpark.

- Red-chested Cuckoo** (*Cuculus solitarius*) Eremitgøg
Set og hørt på fire af rejsens dage.
- African Cuckoo** (*Cuculus gularis*)
Set på tre af rejsens dage. Det højeste antal var tre fugle ved Lake Manyara
- Common Cuckoo** *Cuculus canorus* Gøg
Set på fem af rejsens dage. En velkommen hilsen hjemmefra.
- Slender-tailed Nightjar** (*Caprimulgus clarus*) Kilehalenatravn
Hørt fint om aftenen ved vores camp i Tarangire
- Scarce Swift** *Schoutedenapus myoptilus* Tågeskovsejler
Et halvt hundrede sås over bjergregnskoven ved Ngorongoro. Set på to af rejsens dage,
- African Palm-Swift** (*Cypsiurus parvus*) Afrikansk Palmesejler
Almindelig. Set på 10 af rejsens dage med op til 150 fugle om dagen,
- Little Swift** (*Apus affinis*) Lille Sejler
Almindelig. Især i byer og ved bygninger. Set på ni af rejsens dage.
- White-rumped Swift** (*Apus caffer*) Kaffersejler
Almindelig. Set på syv af rejsens dage med op til 100 fugle om dagen.
- Common Swift** (*Apus apus*) Mursejler
Set på to af rejsens dage.
- African Rail** (*Rallus caerulescens*)
En enkelt sås i et vådområde på kraterbunden, Ngorongoro
- Common Moorhen** (*Gallinula chloropus*) Grønbenet Rørhøne
Lokal. Set på tre af rejsens dage
- Red-knobbed Coot** (*Fulica cristata*) Kamblishøne
Lokal. Set på to af rejsens dage. Det højeste antal var 60 fugle i en sø nær Ngorongoro.
- African Swamphen** (*Porphyrio madagascariensis*) Grønrygget Sultanhøne
Fire sås i et vådområde på kraterbunden, Ngorongoro. Blev førhen regnet som en race af Sultanhøne.
- Black Crake** (*Amaurornis flavirostra*) Sort Rørvagtel
Ret almindelig i vådområder i Østafrika, men som følge af den megen regn var der kun få tørlagte mudderbanker, og den sås derfor kun på tre af rejsens dage med 1-2 fugle om dagen.
- Grey Crowned-Crane** (*Balearica regulorum*) Grå Krontrane
Set på fire af rejsens dage. Det højeste antal var 60 fugle Ngorongoro-krateret.



Crowned Lapwing. Foto Ingelise Aarøe Petersen

Water Thick-knee (*Burhinus vermiculatus*) Vandtriel
Blot en enkelt fugl ved et vådområde i Serengeti. Vidt udbredt ved vådområder i Tanzania.

Spotted Thick-knee (*Burhinus capensis*) Plettet Triel
En tørlands-triel, der er ret almindelig, men svær at se. Vi så to fugle i Serengeti.

Black-winged Stilt (*Himantopus himantopus*) Stylteløber
Almindelig i vådområder. Set på 10 af rejsen dage.

Pied Avocet *Recurvirostra avosetta* Klyde
Ret almindelig. Set på seks af rejsens dage.

Long-toed Lapwing (*Vanellus crassirostris*) Langtået Vibe
En enkelt observation med fire fugle, Ngorongoro-krateret

Black-smith Plover (*Vanellus armatus*) Broget Vibe
Almindelig ved vådområder. Set på 10 af rejsens dage

Spur-winged Plover (*Vanellus spinosus*) Sporevibe
Blot en enkelt observation af en enkelt fugl i Ngorongoro Conservation Area.

Black-winged Lapwing (*Vanellus melanopterus*) Lys Sørgevibe
Knyttet til græsdomineret højlands-savanne. Vi så 10 fugle i Serengeti.



Marsh Sandpiper (Damklire), Nduto. Foto Søren Skov

Crowned Lapwing (*Vanellus coronatus*)

Kronvibe

Knyttet til tørre områder og åbne savanner. Set på otte af rejsens dage.

Kittlitz's Plover (*Charadrius pecuarius*)

Kittlitz's Præstekrave

Set på tre af rejsens dage. Det højeste antal var 10 Lake Burunge.

Common Ringed Plover (*Charadrius hiaticula*)

Stor Præstekrave

Set på tre af rejsens dage. Overvintrende gæst fra Europa/Asien.

Three-banded Plover (*Charadrius tricollaris*)

Trebåndet Præstekrave

Almindelig ved små og store vådområder. Set på otte af rejsens dage.

Chestnut-banded Plover (*Charadrius pallidus*)

15 fugle sås ved Lake Nduto



Chestnut-banded Plover, Nduto. Foto: Søren Skov

Ruff (*Philomachus pugnax*)

Brushane

Ret almindelig vintergæst i vådområder. Set på seks af rejsens dage med op til 20 fugle om dagen.

Curlew Sandpiper (*Calidris ferruginea*)

Krumnæbbet Ryle

Set på to af rejsens dage – begge dage i Nduto-området med henholdsvis seks og tre fugle. .

Sanderling (*Calidris alba*)

Sandløber

Set ved Nduto-søerne

Little Stint (*Calidris minuta*)

Dværgryle

En ret almindelig træk-og vintergæst ved søerne i Rift Valley. Set på otte af rejsens dage. Det højeste antal var 1000 Nduto. Øvrige observationer var under 75 fugle om dagen.

Common Sandpiper (*Actitis hypoleucos*)

Mudderklire

Almindelig ved vandløb og søer. Set på otte af rejsens dage.

Green Sandpiper (*Tringa ochropus*)

Svaleklire

Set på tre af rejsens dage.



Double-banded Courser. Foto: Per Boje

Wood Sandpiper (*Tringa glareola*)

Tinksmed

Almindelig ved vådområder. Set på syv af rejsens dage.

Marsh Sandpiper (*Tringa stagnatilis*)

Damklire

Fåtalig. Set på fem af rejsens dage med op til fem fugle om dagen.

Common Greenshank (*Tringa nebularia*)

Hvidklire

Ret almindelig. Set på syv af rejsens dage.

Temminck's Courser (*Cursorius temminckii*)

Sortøret Ørkenløber

Set på tre af rejsens dage. Det højeste antal var 11 fugle ved "Lark Plains".

Double-banded Courser (*Cursorius africanus*)

Set på fem af rejsens dage. Det højeste antal var 18 Lake Burunge.

Collared Pranticole (*Glareola prantincola*)

Rødvinget Braksvale

50 fugle sås i Tarangire



Abdims Stork. En intra-afrikansk trækfugl, som vi så i stort tal. Foto: Søren Skov

Grey-hooded Gull (*Chroicocephalus cirrocephalus*)
Seks fugle sås ved vådområder i Ngorongoro-krateret.

Gråhovedet Måge

Gull-billed Tern (*Gelochelidon nilotica*)
Set på seks af rejsens dage med op til 20 fugle om dagen.

Sandterne

White-winged Tern (*Chlidonias leucopterus*)
Set på to af rejsens dage. Det højeste antal var 120 fugle, der sås ved vådområder i Ngorongoro-krateret.

Hvidvinget Terne

Whiskered Tern (*Chlidonias hybrida*)
Ved vådområder i Ngorongoro-krateret sås 15 fugle.

African Openbill (*Anastomus lamelligerus*)
Set på fire af rejsens dage med op til fem fugle om dagen.

Afrikansk Gabenæb

Black Stork (*Ciconia nigra*)
To fugle sås i Arusha Nationalpark. Desuden sås en fugl fra bilen vest for Arusha.

Sort Stork



White Pelican, Foto: Søren Skov

White Stork (*Ciconia ciconia*)

Hvid Stork

Talrig vintergæst på de vidstrakte savanner i Serengeti og Ngorongoro Conservation Area. Set på ni af rejsens dage med op til 400 fugle om dagen.

Abdim's Stork (*Ciconia abdimii*)

Ligeledes en almindelig stork på savannen, men dog ikke helt så talrig som den hvide Stork. Vi noterede den på ni af rejsens dage med op til 150 fugle om dagen.

Yellow-billed Stork (*Mycteria ibis*)

Afrikansk Skovstork

Set på tre af rejsens dage. Det højeste antal var 40 ved vådområder i Ngorongoro-krateret.

Marabou Stork *Leptoptilos crumeniferus*

Maraboustork

Almindelig. Set på 11 af rejsens af rejsens dage med op til 50 fugle om dagen.

Saddle-billed Stork (*Ephippiorhynchus senegalensis*)

Saddelnæbs-stork

En enkelt fugl sås i Tarangire.

Long-tailed Cormorant *Phalacrocorax africanus*

Rørskarv

Set på fire af rejsens dage med op til 30 fugle om dagen. De højeste antal var 25 Lake Duluti og 30 Ngorongoro-krateret.

Cormorant *Phalacrocorax (lucidus) carbo*

Skarv

Set på tre af rejsens dage. Det største antal var 10 fugle Lake Duluti. Vi så den afrikanske race *lucidus*, der i checklisten fra Cisticola Tours er omtalt som en race af vores egen europæiske Skarv - *Phalacrocorax carbo*. Den afrikanske race *lucidus* har gennem årene skiftet status flere gange, så den nogle gange er regnet som en egen art og andre gange som en race. I næsten alle nyere bøger om Afrikas fugle er den omtalt som en selvstændig art – White-breasted Cormorant.

Great White Pelican (*Pelecanus onocrotalus*)

Hvid Pelikan

Set på seks af rejsens dage med op til syv fugle om dagen.

Hamerkop (*Scopus umbretta*)

Hammerhoved

Lokal. Set på fire af rejsens dage. Det største antal var fem fugle i Arusha Nationalpark.

Grey Heron (*Ardea cinerea*)

Fiskehejre

Almindelig. Set på syv af rejsens dage med op til fem fugle om dagen.

Black-headed Heron (*Ardea melanocephala*)

Sorthovedet Hejre

Meget almindelig. I modsætning til fiskehejren, ses den også midt ude i det tørre land på savannen. Set på 11 af rejsens dage med op til 30 fugle om dagen.

Great Egret (*Ardea alba*)

Sølvhejre

Lokal og ret fåtallig. Set på tre af rejsens dage med 1-3 fugle om dagen.

Intermediate Egret (*Egretta intermedia*)

Mellemhejre

Hele 60 fugle sås ved vådområder i Ngorongoro-krateret. Desuden sås 2 fugle i Arusha Nationalpark.

Little Egret (*Egretta garzetta*)

Silkehejre

Ret almindelig. Set på fem af rejsens dage med op til 15 fugle om dagen.

Western Cattle Egret (*Bubulcus ibis*)

Kohejre

Meget almindelig. Set på alle rejsens dage med op til 400 fugle om dagen.

Squacco Heron (*Ardeola ralloides*)

Tophejre

Fåtallig. Set på to af rejsens dage, idet en fugl sås i Arusha Nationalpark og to fugle sås ved vådområder i Ngorongoro-krateret.

Striated Heron (*Butorides striata*)

Mangrovehejre

Fåtallig. Set på tre af rejsens dage. Det højeste antal var tre fugle ved Lake Duluti.

Black-crowned Night-Heron (*Nycticorax nycticorax*)

Nathejre En enkelt fugl sås ved Lake Duluti



Secretary-bird, Nduto. En af Afrikas ikoniske fugle. Foto: Søren Skov

Glossy Ibis (*Plegadis falcinellus*)

Sort Ibis

Set på fem af rejsens dage. Det højeste antal var 50 i Ngorongoro-krateret

African Sacred Ibis (*Threskiornis aethiopicus*)

Hellig Ibis

Almindelig, men ingen større antal. Set på seks af rejsens dage.

Hadada Ibis (*Bostrychia hagedash*)

Hadadaibis En almindelig art, som på vores rejse var overraskende fåtallig. Set på fire af rejsens dage med 1-4 fugle om dagen.

African Spoonbill (*Platalea alba*)

Afrikansk

Skestork Set på tre af rejsens dage. Det højeste antal var tre Ngorongoro-krateret.

Secretary-bird (*Sagittarius serpentarius*)

Sekretærfugl

Overraskende fåtallig. Set på tre af rejsens dage med 1-2 fugle om dagen.

Black-shouldered Kite (*Elanus caeruleus*)

Blå Glente

En almindelig karakterfugl. Set på alle rejsens dage med op til 10 fugle om dagen,

African Harrier-Hawk (*Polyboroides typus*)

Afrikansk Klatrehøg

Blot to fugle set i Arusha Nationalpark.



White-backed Vulture Serengeti. Foto: Søren Skov

Palm-nut Vulture (*Gypohierax angolensis*)

Palmegrib

En enkelt fugl sås ved Lake Duluti

White-headed Vulture (*Trigonoceps occipitalis*)

Hvidhovedet Grib

En enkelt fugl sås i Serengeti.

Lappet-faced Vulture (*Torgos tracheliotus*)

Øregrib

Denne art er efterhånden sjælden i det meste af Afrika, men vi kunne glæde os over mange fine observationer. Set syv af rejsens dage med op til seks fugle om dagen.

White-backed Vulture (*Gyps africanus*)

Hvidrygget Grib

Almindelig. Set på ni af rejsens dage med op til 50 fugle om dagen,

Ruppell's Griffon Vulture (*Gyps rueppellii*)

Savannegrib

Markant mere fåtallig end White-backed Vulture, men stadig ret almindelig. Set på seks af rejsens dage.

Hooded Vulture (*Necrosyrtes monachus*)

Hættegrib

Set på tre af rejsens dage med 1-5 fugle om dagen..



Bateleur. Foto: Søren Skov

Bateleur (*Terathopius ecaudatus*)

Gøglerørn

Ret almindelig på savannen i Tanzania i de store nationalparker med urørt natur. I det dyrkede land ses den meget sjældent. Set på 10 af rejsens dage med op til seks fugle om dagen.

Black-breasted Snake-Eagle (*Circaetus pectoralis*)

Hvidbuget Slangeørn

I alt sås tre fugle i Serengeti-området og en enkelt fugl i Tarangire.

Brown Snake-Eagle (*Circaetus cinereus*)

Mørk Slangeørn

I alt sås fire fugle – en ved Lake Manyara og tre i Tarangire..

Martial Eagle (*Polemaetus bellicosus*)

Kampørn

I alt sås syv fugle fordelt på lige så mange obs-dage. Savannens mest kraftfulde ørn, der kan tage mindre antiloper som eksempelvis dik-dik antiloper.

Long-crested Eagle (*Lophaetus occipitalis*)

Topørn

I alt sås fire fugle. Tilknyttet frodig skov

Ayres Hawk Eagle (*Hieraaetus ayresii*)

I alt sås to fugle - en fugl i Arusha Nationalpark og en ved Ngorongoro. Tilknyttet bjergregnskove.



Grasshopper Buzzard, Arusha. Foto: Per Boje.

Wahlbergs Eagle (*Aquila wahlbergi*)

Savanneørn

En enkelt fugl sås i Serengeti.

Tawny Eagle (*Aquila rapax*)

Rovørn

Almindelig. Set på 11 af rejsens dage med 1-7 fugle om dagen.

Steppe Eagle (*Aquila rapax*)

Steppeørn

Set på fire af rejsens dage med op til 10 fugle om dagen,

Verreaux Eagle (*Aquila verreauxii*) V

Verreaux Ørn

En enkelt fugl sås ved Lake Manyara

Dark Chanting-Goshawk (*Melierax metabates*)

Mørk Sanghøg

Almindelig. Set på syv af rejsens dage med op til otte fugle om dagen,

Eastern Chanting-Goshawk (*Melierax poliopterus*) Somalisanghøg
Set på fire af rejsens dage. Det højeste antal var fem fugle ved "Lark Plains". Ses generelt i lavere beliggende savanne end den foregående art.

Gabar Goshawk (*Melierax gabar*)
En enkelt iagttagelse

Grasshopper Buzzard (*Butastur rufipennis*)
En enkelt fugl sås nær Kilimanjaro Airport på rejsens første dag.

Eurasian Marsh Harrier (*Circus aeruginosus*) Rørhøg
To fugle sås i Ngorongoro-krateret

Pallid Harrier (*Circus macrourus*) Steppehøg
I alt sås tre fugle

Montagu's Harrier (*Circus pygargus*) Hedehøg
Ret almindelig vintergæst på Serengeti-savannen. Set på fem af rejsens dage med op til otte fugle om dagen.

Black Kite (*Milvus migrans*) Sort Glente
Almindelig - især ved Arusha by. Set på ni af rejsens dage med op til 10 fugle om dagen. Vi så både vores "egen" race af sorte glente, der er vintergæst i Tanzania, og den gulnæbbede afrikanske race, *paraciticus*, der i dag ofte regnes for en selvstændig art – **Yellow-billed Kite**.

African Fish-Eagle (*Haliaeetus vocifer*) Afrikansk Flodørn
To fugle sås ved Arusha Nationalpark

Common Buzzard *Buteo buteo vulpinus* Musvåge (Steppevåge)
Almindelig vintergæst – set på otte af rejsens dage med op til 10 fugle om dagen. Alle de musvåger, der ses i Østafrika, er af racen *vulpinus* (Steppevåge).

Augur Buzzard (*Buteo augur*) Augurvåge
Almindelig. Set på syv af rejsens dage med op til 12 fugle om dagen.

Pearl-spotted Owlet (*Glaucidium perlatum*) Plettet Spurveugle
Set og hørt på fem af rejsens dage med 1-2 fugle om dagen.

African Scops Owl (*Otus senegalensis*) Afrikansk Dværghornugle
To fugle sås ved vores camp i Tarangire.

Verreaux's Eagle Owl (*Bubo lacteus*)
En fugl hørtes gentagne gange om aftenen ved vores camp i Tarangire



African Fish Eagle, Arusha Nationalpark. Foto: Per Boje

Speckled Mousebird (*Colius striatus*)

Brun Musefugl

Almindelig - ses især i frodigt krat. Set på alle rejsens dage med op til 10 fugle om dagen.

Blue-naped Mousebird *Urocolius macrourus*

Blånakked Musefugl

Ses i lidt mere tør savanne end Speckled Mousebird. Vi noterede den syv af rejsens dage med op til fire fugle om dagen.

Narina Trogon (*Apaloderma narina*)

Blåbrystet Trogon

En enkelt fugl sås fint ved Lake Manyara..



Silvery-cheeked Hornbill, Lake Duluti, Foto: Søren Skov

Hoopoe (*Upupa (africana) epops*)

(Afrikansk) Hærfugl

Set på fire af rejsens dage. Alle de fugle, der blev racebestemt, var af den afrikanske race *africana*, I vores checkliste bliver den regnet som en race af Hærfugl, men den regnes ofte som en egen art.

Green Wood-hoopoe (*Phoeniculus purpureus*)

Purpurskovhærfugl

To iagttagelser af henholdsvis to og seks fugle.

Abyssinian Scimitar-bill (*Rhinopomastus minor*)

Rødnæbbet Seglhærfugl

Set på to af rejsens dage med henholdsvis en og tre fugle.

Southern Ground-Hornbill (*Bucorvus leadbeateri*)

Kafferhornravn

Seks fugle sås ved Lake Manyara.

Crowned Hornbill (*Tockus alboterminatus*)

Krontoko

Set på to af rejsens dage med fire fugle ved Lake Duluti og fem fugle ved Lake Manyara

African Grey Hornbill (*Tockus nasutus*)

Grå Toko

Set på fem af rejsens dage



Giant Kingfisher, Lake Duluti. Foto: Ingelise Aarøe Petersen.

Von der Decken's Hornbill (*Tockus deckeni*)

Sortvinget Toko

Ret almindelig. Set på fem af rejsens dage.

Tanzania Red-billed Hornbill (*Tockus ruahae*)

To fugle sås i Serengeti. Endemisk for Tanzania

Northern Red-billed Hornbill *Tockus erythrorhynchus*

Rødnæbbet Toko

Set på tre af rejsens dage med op til 10 fugle om dagen. Alle observationer var fra Lake Manyara, Burunge og Tarangire.

Silvery-cheeked Hornbill (*Bycanistes brevis*)

Sølvkindet Hornfugl

Set på tre af rejsens dage. De højeste antal var 30 Lake Manyara og 10 Lake Duluti.

Malachite Kingfisher (*Corythornis cristatus*)

Malakitisfugl

Fire observationer af 1-2 fugle. Tilknyttet vådområder.

Gray-headed Kingfisher (*Halcyon leucocephala*)

Gråhovedet Isfugl

Set på syv af rejsens dage. De højeste antal var fra Tarangire, hvor vi på to dage så henholdsvis 7 og 6 fugle. En tørlands-isfugl.

Woodland Kingfisher (*Halcyon senegalensis*)

Skovisfugl

Set på fire af rejsens dage med 1-2 fugle om dagen. Også denne art er en tørlands-isfugl.



White-throated Bee-eater, "Lark Plains". Østafrika byder på mange smukke biædere.
Foto: Ingelise Aarøe Petersen.

Striped Kingfisher (*Halcyon chelicuti*)

Stribet Isfugl

Set på fire af rejsens dage – hver gang med blot en enkelt fugl. Ligeledes en tørlands-art.

Brown-hooded Kingfisher (*Halcyon albiventris*)

En enkelt fugl sås ved Arusha Nationalpark. Også denne art er en tørlands-isfugl.

Pied Kingfisher (*Ceryle rudis*)

Gråfisker

Fem fugle sås ved Lake Duluti. Derudover blot to observationer af enlige fugle.

Giant Kingfisher (*Megaceryle maxima*)

Kæmpestødfisker

To fugle sås fint ved Lake Duluti

White-fronted Bee-eater (*Merops bullockoides*)

Hvidpandet Biæder

Set på to af rejsens dage – begge dage omkring Arusha. Det højeste antal var 25 Arusha Nationalpark. Tilknyttet frodige skove.

Little Bee-eater (*Merops pusillus*)

Dværgbiæder

Almindelig på savannen. Set på ni af rejsens dage.



D'Arnaud's Barbet – racen usambiro, Serengeti. Foto: Søren Skov

Cinnamon-chested Bee-eater (*Merops oreobates*)

Okkerbrystet Biæder

Ret almindelig i højtbeliggende skove. Vi noterede den på tre af rejsens dage. Det højeste antal var fire fugle i Arusha Nationalpark. De to andre iagttagelser var fra bjergregnskoven ved Ngorongoro.



Spot-flanked Barbet, Arusha, Foto: Ingelise Aarøe Petersen

White-throated Bee-eater (*Merops albicollis*)

Hvidstrubet Biæder

En enkelt fugl sås fint ved "Lark Plains"

Blue-cheeked Bee-eater (*Merops persicus*)

Grøn Biæder

Set på fire af rejsens dage med op til fem fugle om dagen

European Bee-eater (*Merops apiaster*)

Europæisk Biæder

Almindelig. Set på seks af rejsens dage med op til 10 fugle om dagen.

Lilac-breasted Roller (*Coracias caudatus*)

Lillabrystet Ellekrage

Almindelig på savannen - især i nationalparker med urørt natur. Set på alle rejsens dage med op til 25 fugle om dagen.

European Roller (*Coracias garrulus*)

Europæisk Ellekrage

Set på syv af rejsens dage med op til fem fugle om dagen.

Rufous-crowned Roller (*Ciracias naevius*)

Set på to af rejsens dage

Red-and-yellow Barbet (*Trachyphonus erythrocephalus*) Pragtperleskægful
Set på tre af rejsens dage – alle gange med to fugle (et par)

D'Arnaud's Barbet (*Trachyphonus darnaudii*) Perleskægful
Set på ni af rejsens dage med op til syv fugle om dagen. Alle fuglene i Serengeti-området var af racen *usambiro* med mørkt næb. Denne race regnes af mange eksperter for en selvstændig art – **Usambiro Barbet**.

White-eared Barbet (*Stactolaema leucotis*)
Fire fugle sås ved Lake Duluti. En art, der har en meget lokal og pletvis udbredelse i Østafrika

Red-fronted Tinkerbird *Pogoniulus pusillus* Rødpandet Tinkerful
Set på fire af rejsens dage – hver gang med en enlig syngende ful.

Red-fronted Barbet *Tricholaema diademata* Diademskægful
En enkelt iagttagelse i Serengeti.

Spot-flanked Barbet *Tricholaema lacrymosa* Dråbeskægful
Fire fugle sås i Arusha Nationalpark

Brown-breasted Barbet (*Lybius melanopterus*)
2-3 fugle sås ved Lake Duluti.

Lesser Honeyguide (*Indicator minor*) Gråbrystet Honninggøg
To observationer af enlige fugle.

Greater Honeyguide (*Indicator indicator*) Sortstrubet Honninggøg
En enkelt observation fra Lake Manyara.

Cardinal Woodpecker (*Dendropicos fuscescens*) Kardinalspætte
Set på otte af rejsens dage med 1-2 fugle.

Mountain Grey Woodpecker (*Dendropicos spodocephalus*) Rødbuget Askespætte
Set på fem af rejsens dage med 1-2 fugle om dagen. Kaldes også for Eastern Grey Woodpecker. Er splittet ud som egen art fra den vidt udbredte African Grey Woodpecker.

Nubian Woodpecker (*Campethera nubica*) Nubisk Spætte
Set på fire af rejsens dage med 1-4 fugle om dagen.

Bearded Woodpecker (*Chloropicua namaquus*)
En enkelt set i Tarangire



Greater Kestrel, Serengeti: Foto Søren Skov

Golden-tailed Woodpecker (*Campethera abingoni*)

En enkelt fugl sås ved Lake Duluti

Pygmy Falcon *Polihierax semitorquatus*

Afrikansk Pygmæfalk

Ret almindelig i lavereliggende savanne. Set på fem af rejsens dage med 1-2 fugle om dagen. Ses ofte nær bøffelvævere, da den yngler i de store reder af bøffelvævere.

Lesser Kestrel (*Falco tinnunculus*)

Lille Tårnfalk

En flok på seks fugle sås i Serengeti

Rock Kestrel (*Falco rupicolus*)

To fugle sås i Serengeti. Blev førhen regnet som en race af vores hjemlige Tårnfalk.

Greater Kestrel (*Falco rupicoloides*)

Set på tre af rejsens dage med op til 10 fugle om dagen. Var almindelig i den østlige del af det centrale Serengeti. Kaldes også for White-eyed Kestrel

Grey Kestrel (*Falco ardosiaceus*)

Grå Tårnfalk

En enkelt observation.



Meyers Parrot. Foto: Ingelise Aarøe Petersen

Hobby (*Falco curvieri*)

Afrikansk Lærkefalk

En enkelt fugl sås ved Ngorongoro

Lanner Falcon (*Falco biarmicus*)

Lannerfalk

Set på to af rejsens dage med henholdsvis to fugle og en enkelt fugl.

Peregrine (*Falco peregrinus*)

Vandrefalk

To fugle sås i Arusha Nationalpark plus en i Ngorongoro Conservation Area.

Fischer's Lovebird (*Agapornis fischeri*)

Ret almindelig i Serengeti og Ngorongoro Conservation Area. Set på syv af rejsens dage med op til 10 fugle om dagen.

Yellow-collared Lovebird (*Agapornis personatus*)

Seks fugle sås i Tarangire

Meyer's Parrot (*Poicephalus meyeri*)

Meyers Papegøje

Set på fire af rejsens dage med op til seks fugle om dagen. Kaldes også Brown Parrot.



Red-bellied Parrot, Tarangire. Foto: Ingelise Aarøe Petersen



Grey-crested Helmetshrike, Serengeti. Foto: Ingelise Aarøe Petersen.

- Red-bellied Parrot** *Poicephalus rufiventris* Rødbuget Brunpapegøje
To fugle sås i Tarangire. Kaldes også for Orange-bellied Parrot.
- Black Cuckoo-shrike** (*Campephaga flava*) Sort Larveæder
Set på to af af rejsens dage – hver gang med en enkelt fugl..
- Purple-Throated Cuckoo-Shrike** (*Campephaga quiscalina*)
En enkelt sås i højjlandsskoven i Arusha Nationalpark
- European Oriole** (*Oriolus percivali*) Pirol
En enkelt observation.
- Black-headed Oriole** (*Oriolus larvatus*) Østafrikansk Hættepirol
Ligeledes en enkelt observation.
- Chin-spot Batis** (*Batis molitor*) Brunstrubet Batis
Set/hørt på fire af rejsens dage
- Grey-crested Helmetshrike** (*Prionops polioloophus*) Gråtoppet Hjelmtornskade
En flok på 15 fugle sås i Serengeti. Endemisk for Østafrika.
- Brubru** (*Nilaus afer*) Nilaus
Almindelig. Set på ni af rejsens dage med 1-2 fugle om dagen. Blev førhen kaldt for Northern Brubru – men der er ingen Southern eller andre brubruer, så i dag har man sløjet "Northern".
- Black-backed Puffback** (*Dryascopus cubla*)
Set på tre af rejsens dage med en til to fugle om dagen.
- Black-crowned Tchagra** (*Tchagra senegalus*) Sortkronet Kratskade
Set på fire af rejsens dage med 1-2 fugle om dagen.
- Brown-crowned Tchagra** (*Tchagra australis*) Brunkronet Kratskade
Set på seks af rejsens dage.
- Tropical Boubou** (*Laniarius aethiopicus*) Bubu
Ret almindelig i frodig vegetation. Set og ikke mindst hørt på fire af rejsens dage.
- Slate-colored Boubou** *Laniarius funebris* Sodbubu
En karakterfugl i tør savanne. Set på 10 af rejsens dage med op til 10 fugle om dagen.
- Black-headed Gonolek** (*Laniarius erythrogaster*)
To fugle (et par) sås i Serengeti.



Rosy-patched Bush-Shrike, The Larks Plains, Foto: Søren Skov

Rosy-patched Bush-Shrike (*Telophorus cruentus*)

To fugle – et par – sås på the "Lark Plains"

Sulphur-breasted Bush-shrike *Malaconotus sulfureopectus* Svovlbrystet Busktornskade
Set på fire af rejsens dage med 1-2 fugle om dagen. Kaldes også for Orange-breasted Bush Shrike.

Fork-tailed Drongo *Dicrurus adsimilis*

Almindelig. Set på 12 af rejsens dage.

Gaffelhalet Drongo

African Paradise-Flycatcher (*Terpsiphone viridis*)

En enkelt observation.

Afrikansk Paradismonark

Red-backed Shrike (*Lanius collurio*)

Almindelig. Set på seks af rejsens dage.

Rødrygget Tornskade

Red-tailed Shrike (*Lanius phoenicuroides*)

Set på fire af rejsens dage. Det højeste antal var 4 fugle ved the "Lark Plains".

Turkestantornskade



Beesley's Lark. Den lille isolerede bestand på "the Lark Plains" blev førhen regnet som en race af Spike-heeled Lark. I check-listen fra Cisticola Tours er den derfor omtalt som Spike-heeled Lark, men i dag regnes den normalt som en egen art.
Foto: Søren Skov

Grey-backed Fiscal (*Lanius excubitoroides*)

Grårygget Tornskade

Set på fire af rejsens dage med op til fem fugle om dagen.

Long-tailed Fiscal (*Lanius cabanisi*)

Kenyatornskade

Lokalt almindelig. Set på seks af rejsens dage.

Taita Fiscal (*Lanius dorsalis*)

Taitatornskade

Lokalt almindelig. Set på seks af rejsens dage med op til fem fugle om dagen

Northern Fiscal (*Lanius humeralis*)

Almindelig. Set på ni af rejsens dage med op til 10 fugle om dagen.

Magpie Shrike (*Lanius melanoleucus*)

Broget Tornskade

Almindelig. Set på seks af rejsens dage med op til 10 fugle om dagen.

Northern White-crowned Shrike (*Eurocephalus rueppelli*)

Hvidgumpet Tornskade

Karakterfugl i tør savanne. Set på 11 af rejsens dage med op til 50 fugle om dagen.

House Crow (*Corvus splendens*)

Set på fem af rejsens dage. Fortrinsvis i Arusha og mindre byer langs landevejen mellem Arusha og Tarangire. Den er indført fra Indien til Zanzibar sidst i 1890'erne og har siden bredt sig til store dele af Østafrika.

Cape Crow (*Corvus capensis*)

Afrikansk Råge

Set i Serengeti på to af rejsens dage med henholdsvis fire og tre fugle.

Pied Crow (*Corvus albus*)

Broget Krage

Almindelig. Set på ni af rejsens dage med op til 10 fugle om dagen. Ses især i byer.

White-necked Raven (*Corvus albicollis*)

En enkelt observation.

White-bellied Tit (*Parus albiventris*)

Hvidbuget Sodmejs

To fugle sås i Serengeti

Red-throated Tit (*Melaniparus fringillinus*)

Set på fire af rejsens dage med 1-2 fugle om dagen.

African Penduline Tit (*Antoscopus caroli*)

En flok på 4-5 fugle sås i Serengeti.

Spike-heeled Lark (*Chersomanes albofasciata*)

Vi så mindst fire fugle på "The Larks Plain". Hovedudbredelsen er i Sydafrika, men på the "Larks Plain" forekommer en lille isoleret bestand af racen *beesleyi*. Denne race regnes i dag normalt for en egen art – **Beesley's Lark** *Chersomanes beesleyi*. Hele populationen er kun på omkring 80 individer.

Fischer's Sparrow-Lark (*Eremopterix leucopareia*)

Savannelærke

Er stedvis almindelig på tørre savanner i Østafrika. Set på fire af rejsens dage.

Fawn-coloured Lark (*Calendulauda africanoides*)

Nominatformen findes i det sydlige Afrika. Racen *alopex*, der findes i Østafrika, regnes i dag normalt for en egen art – **Foxy Lark**. Vi så den på fire af rejsens dage med op til seks fugle om dagen.

Rufous-naped Lark *Mirafraga africana*

Rødnakked Busklærke

Meget almindelig – især på de store græssletter i Serengeti. Set på otte af rejsens dage med op til 100 fugle om dagen.

Sentinel Lark (*Mirafraga athi*)

Blev førhen regnet som en race af Rufous-naped Lark. Er udbredt i Kenya og i et hjørne af det nordlige Tanzania – herunder "The Lark Plains", hvor vi så to fugle.



Rufous-naped Lark, Serengeti. Foto: Ingelise Aarøe Petersen.

Flapped Lark (*Miafra rufocinnamomea*)

Set og hørt på seks af rejsens dage med op til 10 fugle om dagen.

Red-capped Lark (*Calandrella cinerea*)

Vi så mindst 20 fugle på "The Larks Plain"

Short-tailed Lark (*Spizocorys fremantlii*)

Vi så mindst fire fugle på "The Larks Plain". En art, der er ret lokal og pletvis udbredt på tørre savanner i Østafrika.

Somali Short-tailed Lark (*Spizocorys somalica athensis*)

Vi så fire fugle på the "Lark Plains". Fuglene var af racen *athensis*, der forekommer i det nordlige Tanzania og sydlige Kenya. Denne race regnes i dag normalt som en egen art – **Athi Short-tailed Lark.**

Eastern Nicator *Nicator gularis*

En enkelt hørt ved Ngorongoro

Red-faced Crombec *Sylvietta whytii*

Set på tre af rejsens dage.

Rødbuget Crombec



Yellow-breasted Apalis. Foto: Ingelise Aarøe Petersen.

Moustached Grass Warbler (*Melocichia mentalis*)

To fugle sås i Arusha Nationalpark

Yellow-bellied Eremomela (*Eremomela icteropyialis*)

Gulbuget Eremomela

Set på tre af rejsens dage med 1-2 fugle om dagen.

Grey-Wren-Warbler (*Calamonastes simplex*)

Gråsanger

En enkelt observation fra Serengeti.

Grey-backed Camaroptera (*Camaroptera brachyura*)

Askegråsanger

Set og navnlig hørt på 11 af rejsens dage. Kaldes også for Green-backed Camaroptera,

Buff-bellied Warbler (*Phyllolais pulchella*)

Akaciesanger

To fugle sås ved the "Lark Plains". Derudover blot en enkelt fugl i Serengeti.

Yellow-breasted Apalis (*Apalis flavida*)

Gulbrystet Apalis

En savannefugl. Set på fem af rejsens dage med 1-2 fugle om dagen.

Brown-headed Apalis (*Apalis alticola*)

En enkelt observation fra højlandsskoven i Ngorongoro



Red-fronted Prinia, the "Lark Plains". Foto: Per Boje

Karamoja Apalis (*Apalis karamojae stronachi*)

To fugle sås i Serengeti. Den isolerede race i Serengeti/Masai Mara, *stronachi*, regnes nu af de fleste som en selvstændig art – **Masai Apalis**

Tawny-flanked Prinia (*Prinia subflava*)

Set på tre af rejsens dage.

Almindelig Prinia

Red-fronted Prinia (*Prinia rufifrons*)

To fugle sås ved the "Lark Plains".

Rødmasket Apalis

Grey-capped Warbler (*Eminia lepida*)

Set på tre af rejsens dage med 1-2 fugle om dagen.

Papyrusgråsanger

Red-faced Cisticola (*Cisticola erythrops*)

Set på tre af rejsens dage.

Singing Cisticola (*Cisticola cantans*)

To fugle sås og hørtes i Arusha Nationalpark

Trilling Cisticola (*Cisticola woosnami*)

Set på tre af rejsens dage.

Rattling Cisticola (*Cisticola chiniana*)

Akaciecisticola

Den mest almindelige Cisticola-art på savannen. Set på 11 af rejsens dage.

Winding Cisticola (*Cisticola marginatus*)

Sorttrygget Cisticola

Tilknyttet vådområder/frodig savanne. Set på fem af rejsens dage. Det højeste antal var 10 fugle ved Ngorongoro-krateret.

Croaking Cisticola (*Cisticola natalensis*)

Buskcisticola

Set og hørt på fire af rejsens dage

Zitting Cisticola (*Cisticola juncidis*)

Cistussanger

Set og hørt på seks af rejsens dage med op til 10 fugle om dagen.

Desert Cisticola (*Cisticola aridulus*)

Højlandscisticola

To observationer i Serengeti

Pectoral-patch Cisticola (*Cisticola brunnescens*)

Brun Cisticola

Set og hørt på tre af rejsens dage. Alle observationer er fra Serengeti

Black-baked Cisticola (*Cisticola eximius*)

En enkelt observation

Hunter's Cisticola (*Cisticola hunteri*)

Kilimanjaro-cisticola

Almindelig i bjergregnskoven ved Ngorongoro.

African Yellow Warbler (*Iduna natalensis*)

Set på to af rejsens dage – hver gang med en enkelt fugl.

Eastern Olivaceous Warbler *Iduna pallida*

Østlig Bleg Gulbug

En enkelt observation ved krat på the "The Larks Plain".

Icterine Warbler (*Hippolais icterina*)

Gulbug

En enkelt fugl sås ved Ngorongoro.

Sedge Warbler (*Acrocephalus schoenobaenus*)

Sivsanger

En enkelt fugl sås ved vådområder i Ngorongoro-krateret

Lesser Swamp Warbler (*Acrocephalus gracilirostris*)

To fugle sås ved vådområder i Ngorongoro-krateret.

Great Reed Warbler (*Acrocephalus arundinaceus*)

Drosselrørsanger

Hørt i vådområder i Ngorongoro-krateret

Cinnamon Bracken Warbler (*Bradypterus cinnamomeus*) Kopjesanger
Flere hørtes i højlandsskoven ved Ngorongoro – men vi fik dem aldrig at se.

Little Rush Warbler (*Bradypterus baboecala*)
To fugle sås ved vådområder i Ngorongoro-krateret. Fuglene her tilhører den nordlige race, der ofte regnes som en egen art – **Highland Rush Warbler**.

Plain Martin (*Riparia paludicola*) Brunstrubet Digesvale
Set på to af rejsens dage. Hedder også Brown-throated Martin og African Sand Martin.

Banded Martin (*Riparia cincta*) Stor Digesvale
Seks fugle sås i Arusha Nationalpark. En ret almindelig art i Østafrika, men med en pletvis udbredelse.

African Rock Martin (*Ptyonoprogne fuligula*) Bleg Klippesvale
Almindelig ved høje klipper og bygninger i Østafrika. Set på tre af rejsens dage. Regnes traditionelt som en race af Bleg Klippesvale, der også kendes fra Mellemøsten, men flere eksperter mener, at Bleg Klippesvale bør splittes i flere arter, og at den afrikanske form derfor er en egen art.

Barn Swallow (*Hirundo rustica*) Landsvale
En meget almindelig vintergæst. Set på 12 af rejsens dage.

Lesser Striped Swallow (*Cecropis abyssinica*)
Almindelig. Set på syv af rejsens dage.

Rufous-chested Swallow (*Hirundo semifufa*) Rødbrystet Svale
En enkelt fugl sås i Serengeti.

Common House-Martin (*Delichon urbicum*) Bysvale
En enkelt iagttagelse

Black Saw-wing (*Psalidoprocne pristoptera*) Blå Skovsvale
Pletvis almindelig i skovlysninger. Vi så den i Arusha Nationalpark og ved højlandsskoven i Ngorongoro. Set på fem af rejsens dage.

Red-rumped Swallow (*Cecropis daurica*) Rødrygget Svale
Almindelig. Set på 11 af rejsens dage. Traditionelt regnes de afrikanske former af Rødrygget Svale for at være samme art, som den race, der forekommer i Europa, men flere eksperter mener i dag, at Rødrygget Svale skal splittes i flere selvstændige arter.

Sombre Greenbul (*Stelgidilas importunes*)
To fugle sås i Arusha Nationalpark.



Lesser Striped Swallow. Foto: Ingelise Aarøe Petersen

Eastern Mountain Greenbull (*Arizeloicichla nigriceps*)

To fugle sås i bjergregnskoven ved Ngorongoro

Yellow-bellied Greenbull (*Chlorocichla flaviventris*)

En enkelt observation.

Grey-olive Greenbull (*Phyllastrephus cerviniventris*)

Ligeledes en enkelt observation

Little Greenbull (*Eurillas virens*)

Hørt i Arusha Nationalpark

Dark-capped Bulbul (*Pycnonotus barbatus*)

Almindelig. Set på alle rejsens dage.

Berberbulbul

Willow Warbler (*Phylloscopus trochilus*)

Set på syv af rejsens dage med 1-4 fugle om dagen.

Løvsanger

Garden Warbler (*Sylvia borin*)

En enkelt iagttagelse af en enlig fugl

Banded Parisoma (*Curruca boehmi*)

Set på seks af rejsens dage med 1-3 fugle om dagen.

Mbulo White-eye (*Zoosterops mboluensis*)

En enkelt observation med to fugle

Scaly Chatterer (*Argya aylmere*)

En enkelt fugl sås i Ngorongoro Conservation Area

Rufous Chatterer (*Argya rubiginosa*)

En flok på seks fugle blev noteret.

Rødbrun Larmdrossel

Arrow-marked Babbler (*Turdoides jardini*)

En enkelt observation af en enlig fugl.

Black-lored Babbler (*Turdoides sharpei*)

Set på fem af rejsens dage med op til 10 fugle om dagen.

Northern Pied Babbler (*Turdoides hypleuca*)

Set på to af rejsens dage med henholdsvis tre og to fugle – begge dage i Tarangire

Red-billed Oxpecker (*Buphagus erythrorhynchus*)

Almindelig. Set på ni af rejsens dage.

Yellow-billed Oxpecker (*Buphagus africanus*)

Set på fire af rejsens dage.

Wattled Starling (*Creatophora cinerea*)

Almindelig – især i Serengeti og Ngorongoro Conservation Area, hvor tusindtallige flokke sås sammen med de store dyreflokke. Set på 12 af rejsens dage.

Lappestær



Ashy Starling, Tarangire. Foto: Søren Skov

Red-winged Starling (*Onychognathus morio*)

Rødvinget Sortstær

En ret almindelig fugl i Østafrika, hvor den ses ved klipper og bygninger. Vi så den på tre af rejsens dage med 1-2 fugle om dagen.

Waller's Starling (*Onychognathus walleri*) Korthalet Stær
Set på to af rejsens dage. Begge gange i højlandsregnskoven i Ngorongoro.

Hildebrandt's Starling (*Lamprotornis hildebrandti*) Masaiglansstær
Almindelig. Set på ni af rejsens dage med op til 50 fugle om dagen.

Rüppels Starling (*Lamprotornis purpuropterus*) Blågrøn Glansstær
Ret almindelig. Set på fem af rejsens dage.

Ashy Starling (*Lamprotornis unicolor*)
Almindelig i Tarangire.

Superb Starling (*Lamprotornis superbus*) Trefarvet Glansstær
Meget almindelig. Set på alle rejsens dage.

Fischer's Starling (*Spreo fischeri*) Askestær
En art, der i Østafrika især ses i de tørre dele af Kenya, men en lille flig af udbredelsesområdet når ned i det nordlige Tanzania. Vi så en halv snes fugle på the "Larks Plains".

Abyssinian Thrush (*Turdus abyssinicus*) Etioperdrossel
Almindelig i Østafrikas højt beliggende skove og haver. Set på to af rejsens dage – begge gange i Ngorongoros højlandsregnskov. Blev førhen regnet som en race af den sydafrikanske Olive Thrush.

African Bare-eyed Thrush (*Turdus tephronotus*)
En enkelt observation af en syngende fugl. Tilknyttet lavlandet.

African Dusky Flycatcher (*Muscicapa adusta*) Mørk Fluesnapper
Tilknyttet højlandsskov. Set på to af rejsens dage. Begge gange med 2-3 fugle i Ngorongoros højlandsregnskov

Spotted Flycatcher (*Muscicapa striata*)
En ret almindelig vintergæst. Set på fire af rejsens dage med 1-2 fugle om dagen.

African Gray Flycatcher (*Bradornis microrhynchus*) Askegrå Fluesnapper
En savanne-art. Set på 11 af rejsens dage med op til 10 fugle om dagen.

Silverbird (*Empidoenis semipartius*) Sølvrygget Fluesnapper
Almindelig i Serengeti. Set på seks af rejsens dage med op til syv fugle om dagen.

White-eyed Slaty-Flycatcher (*Melaenornis fischeri*) Brillefluesnapper
Tilknyttet højlandsskov. Set på tre af rejsens dage med 1-2 fugle om dagen. Alle observationer er fra Ngorongoros højlandsregnskov. Den lokale race i det nordlige Tanzania mangler den brede hvide øjenring, der har givet arten sit engelske navn.



Ved Burunge mødte vi et tillidsfuldt eksemplar af Red-backed Scrub Robin.
Foto: Per Boje

Red-backed Scrub Robin (*Cercotrichas leucophrys*) Plettet Trænattergal
 Set på seks af rejsens dage. Kaldes også for White-browed Scrub Robin

Grey-winged Robin-Chat (*Serppardia polioptera*)
 Hørt 1. februar

Cape Robin-Chat (*Cossypha caffra*) Kapdrosselsanger
 Set på to af rejsens dage med henholdsvis tre og fire fugle. Alle observationer var fra
 højlandsskoven ved Ngorongoro.

Rüppell's Robin-Chat (*Cossypha semirufa*) Højlandsdrosselsanger
 En enkelt fugl sås i Arusha Nationalpark. Forekommer i større højder end White-browed
 Robin-Chat.

White-browed Robin-Chat (*Cossypha heuglini*) Drosselsanger
 Set på tre af rejsens dage

Spotted Morning-Thrush (*Cichladusa guttata*) Spættet Palmedrossel
 Set på seks af rejsens dage med 1-4 fugle om dagen. Kaldes også for Spotted Palm-
 Thrush.



Cape Robin-Chat, Ngorongoros højlandsskov. Foto: Søren Skov

Thrush Nightingale (*Luscinia luscinia*)

Set og hørt ved Burunge.

Common Rock Thrush (*Monticola saxatilis*)

En enkelt iagttagelse

Stendrossel

Whinchat (*Saxicola rubetra*)

Set på fire af rejsens dage. En ret almindelig vintergæst.

Bynkefugl

African Stonechat (*Saxicola torquatus*)

Ret almindelig i højlandet i Østafrika. Vi måtte dog nøjes med at se 1-2 fugle på to af rejsens dage. Observationerne er fra Arusha Nationalpark og højlandet ved Ngorongoro.

Afrikansk Bynkefugl

Sooty Chat (*Myrmecocichla nigra*)

En enkelt sås Ngorongoro Conservation Area,

Sort Myrepikker

Northern Anteater-Chat (*Myrmecocichla aethiops*)

Set på to af rejsens dage. Det højeste antal var 20 fugle i kraterbunden ved Ngorongoro.

Myrepikker

Northern Wheatear (*Oenanthe oenanthe*)

Almindelig vintergæst. Set på ni af rejsens dage med op til 10 fugle om dagen.

Stenpikker



Golden-winged Sunbird, Ngorongoros højlandsskov. Foto: Per Boje.

Isabelline Wheatear (*Oenanthe isabellina*)

Isabellastenpikker

Set på to af rejsens dage – hver gang med en enkelt fugl.

Pied Wheatear (*Oenanthe pleschanka*)

Nonnestenpikker

Set på fem af rejsens dage med op til fem fugle om dagen.

Cape Wheatear (*Oenanthe pileata*)

Set på tre af rejsens dage. Det højeste antal var 20 ved the "Lark Plains".

Eastern Violet-backed Sunbird (*Anthreptes orientalis*)

Østafrikansk Solfugl

Set på tre af rejsens dage med op til tre fugle om dagen.



Beautiful Sunbird. Foto: Søren Skov

Collared Sunbird (*Hedydipna collaris*)

Kravesolfugl

Set på to af rejsens dage.

Scarlet-chested Sunbird (*Chalcomitra senegalensis*)

Skalagenbrystet Solfugl

Ret almindelig. Set på fire af rejsens dage.

Bronze Sunbird (*Nectarina kilimensis*)

Set på to af rejsens dage.

Golden-winged Sunbird (*Drepanorhynchus reichenowi*)

Gyldenvinget Solfugl

Set på to af rejsens dage med 1-2 fugle. Begge dage i højlandsskoven ved Ngorongoro.

Eastern Double-collared Sunbird *Cinnyris medioc*

Østlig Halsbåndsolflugt

Fire fugle sås i højlandsskoven i Ngorongoro.

Beautiful Sunbird (*Cinnyris pulchellus*)

Langhalet Pragtsolfugl

Ret almindelig i Serengeti. Set på fem af rejsens dage.



Black-necked Weaver. Foto: Ingelise Aarøe Petersen

Black-bellied Sunbird (*Cinnyris nectarinoides*)

En enkelt observation

Variable Sunbird (*Cinnyris venustus*)

Savannesolfugl

Almindelig. Set på ni af rejsens dage med op til syv fugle om dagen.

Red-billed Buffalo-Weaver (*Bubalornis niger*)

Rødnæbbet Bøffelvæver

Almindelig. Set på seks af rejsens dage.

White-headed Buffalo-Weaver (*Dinemellia dinemelli*)

Hvidhovedet Bøffelvæver

Almindelig. Set på ni af rejsens dage. Bygger store reder, som udnyttes af Pygmy Falcon, der yngler i dens reder.

Speckle-fronted Weaver (*Sporopipes frontalis*)

Skælhovedet Finkevæver

Set på syv af rejsens dage med op til 20 fugle om dagen.

White-browed Sparrow-Weaver (*Plocepasser mahali*)

Spurvevæver

Lokalt almindelig. Set på tre af rejsens dage.



Vitaline Masked Weaver i færd med at bygge rede. Bemærk redens arts-karakteristiske facon som en omvendt tekop. Foto: Søren Skov

Rufous-tailed Weaver (*Hisurgops rufouscapulatus*)

Denne store, endemiske væverfugl sås almindeligt i Serengeti. Vi noterede den på otte af rejsens dage med op til 50 fugle om dagen.

Grey-headed Social-Weaver (<i>Pseudonigrita arnaudi</i>) Set på seks af rejsens dage med op til 150 fugle om dagen.	Ørkenvæver
Black-capped Social-Weaver (<i>Pseudonigrita cabanisi</i>) En enkelt observation med to fugle.	Sorthættet Ørkenvæver
Red-headed Weaver <i>Anaplectes rubriceps</i> Set på to af rejsens dage med henholdsvis to fugle og en enlig fugl.	
Baglafaecht Weaver (<i>Ploceus baglafaecht</i>) Almindelig. Set på syv af rejsens dage.	Baglafaecht Væver
Little Weaver (<i>Ploceus luteolus</i>) Set på to af rejsens dage – begge gange i Serengeti.	Dværgvæver
Black-necked Weaver (<i>Ploceus nigricollis</i>) Set på fire af rejsens dage.	
Holub's Golden Weaver (<i>Ploceus xanthop</i>) En enkelt observation fra Ngorongoro-krateret,	Safrangul Væver
Taveta Golden Weaver (<i>Ploceus castaneiceps</i>) 20 fugle sås ved en koloni, Lake Duluti. Desuden 3 Arusha Nationalpark.	
Lesser Masked Weaver (<i>Ploceus intermedius</i>) Almindelig. Set på seks af rejsens dage.	Lille Væver
Vitelline Masked Weaver (<i>Ploceus vitellinus</i>) Almindelig. Set på otte af rejsens dage.	Blommegul Maskevæver
Speke's Weaver (<i>Ploceus spekei</i>) Lokal. Set på to af rejsens dage.	Somalivæver
Village Weaver (<i>Ploceus cucullatus</i>) Almindelig. Set på syv af rejsens dage.	Stor Maskevæver
Chestnut Weaver (<i>Ploceus rubiginosus</i>) Set i Tarangire.	
Cardinal Quela (<i>Quela cardinalis</i>) Set på seks af rejsens dage. Den gode forekomst skyldes den megen regn.	Kardinalvæver
Red-billed Quelea (<i>Quelea quelea</i>) Almindelig. Set på 10 af rejsens dage.	Blodnæbsvæver



Black-winged Bishop, han, i sin fine pragtdragt. Foto: Per Boje.



Black Bishop han. Foto: Inge Aarøe Petersen.



Fan-tailed Widowbird, Ngorongoro-krateret. Foto: Søren Skov

Southern Red Bishop (*Euplectes orix*)

Set på fire af rejsens dage med op til 20 fugle om dagen. Alle observationer var fra Lake Manyara, Burunge og Tarangire.

Black-winged Bishop (*Euplectes hordeaaceus*)

Almindelig i Serengeti. Set på fem af rejsens dage med op til 25 fugle om dagen.

Yellow-crowned Bishop (*Euplectes afer*)

Napoleonsvæver

Set på to af rejsens dage.

Black Bishop (*Euplectes gierowii*)

Set på fire af rejsens dage med op til 10 fugle om dagen. Alle observationer var fra Lake Manyara, Burunge og Tarangire. Racen *friederchseni*, der af nogle eksperter betragtes som en egen art: **Southern Black Bishop**.

Yellow Bishop (*Euplectes capensis*)

Set på to af rejsens dage.

White-winged Widowbird (*Euplectes albonotatus*)

Set på fem af rejsens dage med op til 50 fugle om dagen.



Grey-headed Nigrita, højlandsskoven ved Ngorongoro. Foto: Søren Skov

Red-cowled Widowbird (*Euplectes laticauda*)

Set på to af rejsens dage. Blev førhen regnet som den nordlige race af Red-collared Widowbird *Euplectes ardens*, men denne art er blevet splittet som følge af forskelle i yngledragt og halelængde. Red-cowled Widowbird har nu status som egen art. Dermed forekommer Red-collared Widowbird i Østafrika kun i det sydlige Tanzania.

Fan-tailed Widowbird (*Euplectes axilaris*)

Set på fem af rejsens dage. Det højeste antal var mindst 100 fugle i de fugtige grasslands nede i Ngorongoro-krateret.

Jackson's Widowbird (*Euplectes jacksoni*)

Set på to af rejsens dage. Begge dage i højtbeliggende grasslands ved Ngorongoro.

Grosbeak Weaver (*Amblyospiza albifrons*)

Fire fugle sås ved Lake Duluti.

Grey-headed Silverbill (*Spermestes griseicapilla*)

Ret almindelig i Serengeti. Set på fire af rejsens dage.

Perlehalsamadine



Pin-tailed Whydah. Foto: Søren Skov

Bronze Mannikin (*Spermestes cucullatus*)

Skadefinke

Ligeledes set på fire af rejsens dage.

Yellow-bellied Waxbill (*Coccothraustes vespertina*)

Grønrygget Astrild

En halv snes fugle sås ved en græsrabat i højlandet ved Ngorongoro.

Grey-headed Negrita (*Nigrita canicapillus*)

Skovastrild

Set på to af rejsens dage med henholdsvis seks og to fugle. Begge observationer er fra højlandsskoven ved Ngorongoro.

Black-faced Waxbill (*Estrilda erythroneura*)

En enkelt observation med 4-5 fugle.

Common Waxbill (*Estrilda astrild*)

Helena-astrild

Set på tre af rejsens dage.

Crimson-rumped Waxbill (*Estrilda rhodopygia*)

Set ved Ngorongoro

Quailfinch (*Ortygospiza atricollis*)

5-6 fugle sås opflyvende i det høje græs i Serengeti, da vi kørte ud mod leoparden.

Kendes ret let på deres kuglerunde facon i flugten.



Eastern Paradise Whydah, Foto: Søren Skov

Cut-throat Finch (*Amadina fasciata*)

Båndfinke

Set på to af rejsens dage.

Purple Grenadier (*Granatina ianthinogaster*)

Violbuget Granatastrild

Almindelig. Set på seks af rejsens dage.

Red-cheeked Cordon-bleu (*Uraeginthus bengalus*)

Sommerfuglefinke

Almindelig. Set på fem af rejsens dage.

Blue-capped Cordon-bleu (*Uraeginthus cyanocephalus*) Blåhovedet Sommerfuglefinke

Almindelig. Set på ni af rejsens dage.

Green-winged Pytilia (*Pytilia melba*)

Broget Astrild

Set på tre af rejsens dage.

Red-billed Firefinch (*Lagonosticta senegala*)

Amarant

Set på seks af rejsens dage.



Chestnut Sparrow Foto: Søren Skov

Pin-tailed Whydah (*Vidua macroura*)

Dominikanerenke

Set på syv af rejsens dage. Alle hanner i pragtdragt,

Eastern Paradise-Whydah (*Vidua paradisea*)

Paradisenke

Set på syv af rejsens dage med op til 40 fugle om dagen.

Steel-blue Whydah *Vidua hypocherina*

Set på fem af rejsens dage.

Straw-tailed Whydah (*Vidua fischeri*)

Stråvidafinke

Set på fire af rejsens dage.

Village Indigobird (*Vidua chalybeate*)

Atlaskfinke

Set på fire af rejsens dage.

House Sparrow (*Passer domesticus*)

Gråspurv

Almindelig. Set på 11 af rejsens dage. Alle gråspurve i Østafrika er af den indiske race *indicus*, der for mere end 100 år siden blev indført til Zanzibar. Herfra har den siden spredt sig til store dele af Østafrika.

Kenya Rufous Sparrow (*Passer rufocinctus*)

Kenyaspurv

Set på otte af rejsens dage. Endemisk for Østafrika.



Rosy-throated Longclaw. Foto: Per Boje

Northern Gray-headed Sparrow (*Passer griseus*)

Almindelig. Set på otte af rejsens dage.

Swahili Sparrow (*Passer swahelicus*)

Almindelig. Set på seks af rejsens dage.

Yellow-spotted Bush Petronia *Gymnoris pyrgita*

Set på to af rejsens dage med henholdsvis tre og to fugle.

Pyrgitastenspurv

Chestnut Sparrow *Passer eminibey*

Set på to af rejsens dage.

Kastanjebrun Spurv

Western Yellow Wagtail (*Motacilla flava*)

Set på seks af rejsens dage. Fuglene blev ikke racebestemt.

Gul Vipstjert

African Pied Wagtail (*Motacilla aguimp*)

Almindelig. Set på 10 af rejsens dage.

Afrikansk Vipstjert

African Pipit (<i>Anthus cinnamomeus</i>) Almindelig. Set på seks af rejsens dage.	Savannepiber
Long-billed Pipit <i>Anthus similis</i> Set på to af rejsens dage.	Langnæbbet Piber
Plain-backed Pipit (<i>Anthus leucophrys</i>) Flere sås i Serengeti, men mangelfuldt noteret.	Afrikansk Storpiber
Yellow-throated Longclaw (<i>Macronyx croceus</i>) To fugle sås i Serengeti.	Gulbrystet Sporepiber
Pangani Longclaw (<i>Macronyx aurantiigula</i>) Set på to af rejsens dage.	Panganisporepiber
Rosy-throated Longclaw (<i>Macronyx ameliae</i>) Set på to af rejsens dage.	Rosasporepiber
Southern Citril (<i>Serinus hyposticta</i>) Set på to af rejsens dage. Blev førhen regnet som en sydlig/østlig race af African Citril, men er nu splittet op og regnes som en selvstændig art.	
Reichenow's Seedeater (<i>Serinus rechenowi</i>) Set på to af rejsens dage. Kaldes også for Yellow-rumped Seed-eater	Miombosisken
White-bellied Canary (<i>Serinus dorsostrita</i>) Almindelig. Set på syv af rejsens dage. Tilknyttet tør savanne.	Hvidbuget Sisken
Streaky Seed-eater (<i>Serinus striolatus</i>) Set på tre af rejsens dage med op til 15 fugle om dagen. En højlandsart.	Stribet Sisken
Yellow-crowned Canary (<i>Serinus flavivertex</i>) En enkelt iagttagelse af to fugle.	
Cinnamon-breasted Rock-bunting <i>Emberiza tahapisa</i> En enlig fugl sås fint i Serengeti.	Afrikansk Klippeværler

Pattedyr:

Systematikken følger checklisten fra Cisticola Tours.



Gentle Monkey (Zanzibar Syke's Monkey), Arusha NP. Foto: Ingelise Aarøe Petersen

Rock Hyrax (*Procavia capensis*)

Klippegrævling

Overraskende få, idet vi kun så en enkelt i Serengeti. Er udbredt i store dele af Afrika og Mellemøsten og opdeles af nogle eksperter i op til fem forskellige arter.

African Bush Elephant (*Loxodonta africana*)

Afrikansk Savanneelefant

Almindelig. Set på otte af rejsens dage. Sås ret fåtalligt på de store græssletter i Serengeti, men i Tarangire så vi op til 60 om dagen. I tørtiden samles elefanterne i større flokke, og da kan der i Tarangire ses flokke på flere hundrede.



Leopard, Serengeti: Foto: Søren Skov

Black and White Colobus (*Colubus guereza*)

Sort-hvid Colobus abe

Almindelig i skovene omkring Arusha. Vi så henholdsvis fire og seks dyr ved Lake Duluti og Arusha Nationalpark, begge steder racen *caudatus*.

Olive Baboon (*Papio anubis*)

Anubisbavian

Almindelig. Set på ni af rejsens dage, De største antal var ved Lake Manyara, hvor vi så mindst 200 dyr.

Vervet Monkey (*Cercopithecus aethiops*)

Grøn Marekat

Almindelig. Set på seks af rejsens dage. Arten er vidt udbredt i Afrika og opdeles i flere racer. Vi så den i Østafrika almindelige race *hilgerti*,

Gentle Monkey (*Cercopithecus mitis*)

Set ved Lake Duluti og i Arusha Nationalpark med henholdsvis to og syv dyr. Har et stort udbredelsesområde og er delt op i mange racer. Vi så racen *albogularis*, der har det engelske navn **Zanzibar Syke's Monkey**.

Ochre Bush Squirrel (*Parexerus ochraceus*)

To observationer af enlige dyr



Serval, Serengeti. Foto: Ingelise Aarøe Petersen

Unstriped Ground Squirrel (*Xerus rutilus*)

Set i Serengeti, ved Burunge og i Tarangire. Set på fire af rejsens dage.

Nairobi Grass Rat (*Lemniscomys nairobæ*)

Overraskende talrig. Formentlig på grund af den megen regn. Set på seks af rejsens dage med op til 25 dyr om dagen.

African Savanna Hare (*Lepus victoriae*)

En enkelt iagttagelse.

Yellow-winged Bat (*Lavia frons*)

Den ene bil så flere, der fløj ud fra en busk i Serengeti.

Wahlberg's Epauleted Fruit Bat (*Epomophorus wahlbergi*)

Et halvt hundrede sås på rejsens sidste dag i et træ på p-pladsen ved hotellet nær Kilimanjaro Airport.



Banded Mongose, Serengeti. Foto: Søren Skov

African Wolf (*Canis lupaster*)

En enkelt iagttagelse af et dyr i Ngorongoro Conservation Area. Hed førhen Golden Jackal, da den er på størrelse med en sjakal og har en gyldenbrun pels, men nye DNA-undersøgelser har vist, at den ikke hører til sjakal-familien, men tværtimod er tæt beslægtet med ulven.

Black-backed Jackal (*Canis mesomelas*)

Skaberaksjakal

Set på fire af rejsens dage med i alt ni dyr.

Bat-eared Fox (*Otocyon megalotis*)

To dyr sås ved Nduto

Lion (*Panthera leo*)

Løve

Set på fem af rejsens dage med i alt 29 dyr.

Leopard (*Panthera pardus*)

Leopard

To iagttagelser. Den mest mindeværdige var en leopard, der sås på kort afstand midt på græssletten i Serengeti.

Serval (*Leptailurus serval*)

Et flot eksemplar så jagende på kort afstand ved Nduto.



Giraf, Arusha Nationalpark. Foto: Søren Skov

Cheetah (*Acinonyx jubatus*)

Gepard

To forskellige individer i Serengeti.

Spotted Hyena (*Crocuta crocta*)

Plettet Hyæne

Almindelig, set på fem af rejsens dage.

Egyptian Mongoose (*Herpestes ichneumon*)

Faraorotte

En enkelt iagttagelse. Dens store udbredelsesområde omfatter også Nordafrika og det sydlige Spanien.

Slender Mongoose (*Herpestes sanguineus*)

Almindelig. Set på seks af rejsens dage.

Banded Mongoose (*Mungus mungo*)

Zebramangust

Almindelig, set på fem af rejsens dage. Lever normalt i flokke. Den mest mindeværdige oplevelse en flok på 23 dyr ved et frokoststed i Serengeti.

Dwarf Mongoose (*Helogale pervula*)

Dværgmangust

Set på fem af rejsens dage.



Sikken nogle bisser. Flodheste, Serengeti: Foto: Søren Skov

Plains Zebra (*Equus burchelli*)

Almindelig Zebra

Talrig. De højeste antal sås i Serengeti og Ngorongoro Conservation Area, hvor vi så mange tusinde. Kaldes også for Common Zebra.

Black Rhinoceros *Diceros bicornis*

Sort næsehorn

Set på to af rejsens dage – begge gange nede i Ngorongoro-krateret. Første gang var da vi kørte langs kraterranden mod Serengeti, og standsede ved et udsigtspunkt. Her sås et næsehorn på lang afstand. Anden gang var, da vi besøgte kraterbunden hele dage. Her sås mindst seks forskellige sorte næsehorn.

Giraffe (*Giraffa camelopardalis*)

Giraf

Almindelig. Set på ni af rejsens dage. Er opdelt i flere racer. Vi så Masaigiraffen *tippelskirchi*.

Warthog (*Phacocherus africanus*)

Vortesvin

Almindelig. Set på 10 af rejsens dage.

Hippopotamus (*Hippopotamus amphibius*)

Flodhest

Almindelig ved søer og floder. Set på syv af rejsens dage. Den mindst mindeværdige oplevelse var i Serengeti, hvor vi så en flok på omkring 120 dyr, der lå tæt sammen.

African Buffalo (*Syncerus caffer*)

Kafferbøffel

Almindelig. Set på syv af rejsens dage.

Bushbuck (*Traelaphus scriptus*)

Skriftantilope

Set på to af rejsens dage. Største tal var fire dyr i Arusha Nationalpark.

Eland (*Traelaphus oryx*)

Elsdyrantilope

Set på tre af rejsens dage med i alt 16 dyr.

Suni *Nesotragus moschatus*

1 Arusha Nationalpark

Kirk's Dik-Dik (*Madoqua kirki*)

Kirk's Dik-Dikantilope

Set på tre af rejsens dage.

Thomson's Gazelle (*Gazella thomsonii*)

Thomsons Gazelle

Meget almindelig – især i Serengeti og Ngorongoro Conservation Area, hvor der sås tusindvis af dyr.

Grant's Gazelle (*Gazella granti*)

Grants Gazelle

Ligeledes ganske almindelig, men sås i betydeligt færre antal i forhold til Thomson's Gazelle. Vi så racen *granti*.



Gnuer på vandring, Ngorongoro Conservation Area. Foto: Søren Skov

Bohor Reedbuck (*Redunca redunca*)
En enkelt observation.

Bohor Rørbuk

Waterbuck (*Kobus ellipsiprymnus*)

Vandbuk

Almindelig. Vi så både racen Common Waterbuck *K. e. ellipsiprymnus* og racen Defassa Waterbuck *K. e. defassa*.

Impala (*Aepyceros melampus*)

Impala

Almindelig. Set på 10 af rejsens dage.

Topi (*Damaliscus korrigum*)

Topi-antilope

Almindelig i Serengeti. Deltager ikke i det store træk i Masai Mara-Serengeti, men opholder sig året rundt i nogenlunde de samme områder.

Hartebeest (Kongoni) (*Alcelaphus buselaphus*)

Koantilope

Set på fem af rejsens dage.

White-bearded Gnu *Connochaetes taurinus*

Gnu

I Serengeti/Ngorongoro Conservation Area sås titusinder af dyr. Også talrig på kraterbunden i Ngorongoro. Desuden sås to dyr på the "Larks Plain".

Blandt andre dyr kan nævnes:

Vi så bl.a. Nilkrokodille, Leopardskildpadde, Nilvaran og mindst fem forskellige kamæleoner, der formentlig alle tilhørte arten Flappet-headed Chamaleon.